

2018 全国卫生专业技术资格考试 口腔医学(中级)50 考点

1. 牙内陷常见于上颌侧切牙,偶发于上颌中切牙或尖牙,牙中牙是牙内陷最严重的一种。
2. 急性化脓性腮腺炎的致病菌主要是金黄色葡萄球菌。
3. 外科手术最常用的止血方法是钳夹、结扎止血法。
4. 颌骨骨折最常见的体征是咬合错乱。
5. 腺源性感染最常见于下颌下间隙感染。
6. 疱疹性口腔炎不宜使用激素类药物。
7. 可引起牙龈增生的药物有硝苯地平、苯妥英钠、环孢素。
8. 牙挺原理包括楔原理、轮轴原理、杠杆原理。
9. 皮片越薄,移植成活力越强。
10. 下颌第二前磨牙最常见畸形中央尖。
11. 圈形卡环多用于远中孤立的磨牙上。
12. II 型观测线为基牙向缺隙方向倾斜时所画。
13. 肯氏三类是一侧后牙缺失,缺隙前后都有天然牙,单侧非游离端缺牙。
14. 釉质是人体中最硬的组织,无机物占总重量的 96%~97%,有机物占总重量的 1%。
15. 新生线见于乳牙和第一恒磨牙。
16. 牙周膜纤维结构有牙槽嵴组、水平组、斜行组、根尖组、根间组。
17. 口腔白斑可根据临床表现的不同,分为均质型和非均质型。非均质型又分为疣状型、溃疡型和颗粒型。
18. 治疗厌氧菌感染的首选药是:甲硝唑。
19. 正常人的开口度为 3.7~4.5 cm,低于该值表明有开口受限。
20. 下颌骨薄弱部位:正中联合,颞孔区,下颌角,髁状突颈部。
21. 半解剖式人工牙的牙尖斜度:20 度。
22. 血链球菌是最早在牙面定居的细菌之一。
23. 负压引流 24 小时内引流液不超过 20~30 ml 即可拔出引流条。
24. 双侧唇裂整复术宜在出生后 6~12 个月内进行。
25. 乳牙的特点:牙冠短小,色白,颈嵴明显,冠根分明。上颌乳尖牙的牙尖偏远中。下颌乳前牙的舌面边缘嵴与颈嵴比恒前牙明显。乳磨牙根干短,根分叉大。
26. 粘结力与粘结面积成正比,粘结力与粘固剂的厚度成反比。粘固剂厚度不超过 30 μ m
27. 金瓷结合力-化学结合(最主要),机械结合,压缩结合,范德华力
28. 桩冠要求:根尖部保留 3-5mm 根充材料,桩的长度为根长的 2/3-3/4,直径为根径的 1/3。

- 29.腭裂是口腔较常见的一种畸形,为侧腭突和鼻中隔未融合或部分融合的结果。
- 30.牙髓中的主要细胞是成纤维细胞,故又称为牙髓细胞。
- 31.慢性牙髓炎根据临床表现可分为闭锁性、溃疡性、增生性。
- 32.慢性盘状红斑狼疮区别于扁平苔藓的病理表现是可见角质栓塞,血管周有淋巴细胞浸润。
- 33.口腔黏膜念珠菌感染的病理变化是角化层内形成微小脓肿。
- 34.含牙囊肿内衬上皮发生于缩余釉上皮。
- 35.描述性流行病学的方法主要有横断面研究、纵向研究和常规资料分析。
- 36.偏倚是由于某些原因造成检查结果与实际情况不符,属于系统误差,应该设法防止,其常见的种类有选择性偏倚、无应答偏倚和信息偏倚。
- 37.WHO 评价龋病流程序度的标准年龄组是 12 岁。
- 38.在碳水化合物中致龋性最强的是蔗糖。
- 39.氟排泄的主要途径是肾。
- 40.氟滴剂适用于 2 岁以下的幼儿。
- 41.变形链球菌有强的致龋性主要取决于其产酸性和耐酸性。
- 42.下颌第一磨牙各表面患龋病的顺序依次为咬合面、颊面、近中面、远中面和舌面。
- 43.氟牙症是氟摄入量过高引起的一种特殊类型的釉质发育不全。
- 44.舍格伦综合征:唾液腺肿大以腮腺最常见,唇腺活检,主导管葱皮样改变,末梢导管点球状扩张
- 45.慢性复发性腮腺炎:儿童 5 岁多见,自愈性,迁延不愈变成人复发性腮腺炎。造影末梢导管点球状,胶冻样脓液
- 46.下颌下腺前部结石用下颌横断(牙合)片,后部用下颌下腺侧位片
- 47.如果牙槽突的吸收超过根长的 1/3,就不宜选作基牙。
- 48.回力卡环具有应力中断作用的原因是基托相连,(牙合)力通过人工牙和基托传到黏膜和颌骨上,减轻基牙的负担。
- 49.翼内肌有深、浅两头,深头起于翼外板的内侧面和腭骨锥突,浅头起于腭骨锥突和上颌结节。
- 50.翼外肌有上、下两头,上头起于蝶骨大翼的颞下面和颞下嵴,下头起于翼外板的外侧面,向后外方走行,止于髁突颈部的关节翼肌窝、关节囊和关节盘。

2018 全国卫生专业技术资格考试 口腔医学(中级)50 考题

1.后堤区属于无牙颌功能分区的

- A.缓冲区
- B.舌侧翼缘区
- C.副承托区
- D.主承托区
- E.边缘封闭区

【答案】E

2.男,65岁。舌癌行右侧颈淋巴清扫术,正确的创口处理是

- A.片状引流
- B.管状引流
- C.纱条引流
- D.闭式引流
- E.不放引流

【答案】D

3.三角瓣成活后断蒂的时间为术后

- A.8-10天
- B.14-21天
- C.45-60天
- D.28-35天
- E.5-7天

【答案】B

4.关于固定桥基牙选择标准,错误的是

A.桥基牙(牙合)力比值的总和应等于或大于桥基牙及缺失牙(牙合)力比值的总和

B.基牙支持力不足时,增加的桥基牙应放在较弱的基牙侧

C.多根牙的根分叉高宽者较融合根的支持力强

D.牙根的横断面呈椭圆,扁圆或哑铃形的基牙支持作用较好

E.基牙牙周膜面积的总和等于或大于

缺失牙牙周膜面积的总和

【答案】A

5.不做初期缝合的创口是

- A.无菌创口
- B.污染窗口
- C.感染创口
- D.切开拔牙创口
- E.有组织缺损的无菌创口

【答案】C

6.与金瓷结合强度无关的是

- A.基底冠厚度
- B.预氧化处理基底
- C.金、瓷的化学组成
- D.金、瓷热膨胀系数
- E.基底冠合金种类

【答案】A

7.腮腺多行性腺瘤的临床表现不包括

- A.不影响面神经功能
- B.表面光滑呈结节状
- C.常有消长史
- D.常以耳垂为中心生长
- E.肿瘤生长缓慢

【答案】C

8.男,25岁与人斗殴时面部被刀砍伤,患者临床检查发现同侧额纹消失考虑可能受损的面神经分支为

- A.颞支
- B.颧支
- C.颊支
- D.下颌缘支
- E.颈支

【答案】A

9.拔上颌磨牙时牙根完整拔除,拔牙后

发现口腔上颌窦瘘,穿孔小于 1mm 时

- A. 必须做瘘口修补术
- B. 使拔牙创面充满血块
- C. 冲洗拔牙创面
- D. 填塞明胶海绵
- E. 行上颌窦根治

【答案】B

10. 临床上对乳牙近髓深龋的治疗最好采用

- A. 直接盖髓
- B. 间接盖髓
- C. 冠髓切除术
- D. 干髓术
- E. 根管治疗

【答案】B

11. 牙内陷最严重的情况是

- A. 畸形舌侧窝
- B. 牙中牙
- C. 畸形根面沟
- D. 畸形舌侧尖
- E. 锥形牙

【答案】B

12. 牙膏成分中起到降低表面张力作用的是

- A. 摩擦剂
- B. 胶粘剂
- C. 防腐剂
- D. 洁净剂
- E. 润湿剂

【答案】D

13. 在口腔健康调查中由于调查对象的代表性差,导致调查结果与实际不符,这属于

- A. 随机误差
- B. 无应答偏倚
- C. 选择性偏倚
- D. 检查者之间偏性
- E. 检查者本身偏性

【答案】C

14. 生长线、横纹均明显的早期釉质龋的病理改变位于

- A. 表层
- B. 透明层
- C. 暗层
- D. 脱钙层
- E. 病损体部

【答案】E

15. 口腔黏膜上皮的生发层是指

- A. 基底层和颗粒层
- B. 基底层和棘层
- C. 颗粒层和棘层
- D. 颗粒层和角质层
- E. 角质层和基底层

【答案】B

16. 能调节唾液的量及渗透压的结构是

- A. 浆液性腺泡
- B. 粘液性腺泡
- C. 润管
- D. 分泌管
- E. 排泄管

【答案】D

17. 正常小开口运动时,运动的轴心在

- A. 髁突
- B. 下颌孔
- C. 喙突
- D. 下颌小舌
- E. 关节盘

【答案】A

18. 下颌骨最不易发生骨折的部位是

- A. 下颌角
- B. 下颌体
- C. 髁状突颈
- D. 正中联合
- E. 颏孔区

【答案】B

19. 干槽症发生在拔牙术后的几天

- A. 马上
- B. 1 天

- C.3 天
- D.5 天
- E.10 天

【答案】C

20.根据唇腭裂序列治疗的原则,进行腭形成术的年龄应在

- A.3-6 个月
- B.12-18 个月
- C.2-3 岁
- D.4-5 岁
- E.6-7 岁

【答案】B

21.进行窝沟封闭时乳牙酸蚀时间是

- A.20 秒
- B.30 秒
- C.40 秒
- D.50 秒
- E.60 秒

【答案】E

22.神经嵴可衍化为下列细胞,除了

- A.成釉细胞
- B.成牙本质细胞
- C.成牙骨质细胞
- D.牙髓细胞
- E.牙周膜成纤维细胞

【答案】A

23.唇裂发生的原因是

- A.上颌突和下颌突未联合或部分联合
- B.中鼻突和侧鼻突未联合或部分联合
- C.上颌突和侧鼻突未联合或部分联合
- D.球状突和上颌突未联合或部分联合
- E.两侧侧鼻突未融合或部分融合

【答案】D

24.因磨损、酸蚀或龋等较重的刺激,使成牙本质细胞突起变性、分解,小管内充满空气,形成

- A.修复性牙本质
- B.第三期牙本质

- C.透明牙本质
- D.反应性牙本质
- E.死区

【答案】E

25.胶原纤维排列与牙本质小管平行的牙本质是

- A.管周牙本质
- B.管间牙本质
- C.前期牙本质
- D.球间牙本质
- E.罩牙本质

【答案】E

26.下列口腔黏膜中不属于被覆黏膜的是

- A.唇黏膜和颊黏膜
- B.硬腭黏膜和舌背黏膜
- C.口底黏膜和舌腹黏膜
- D.软腭黏膜和唇红黏膜
- E.牙槽黏膜和口底黏膜

【答案】B

27.下列腺体中属于纯浆液腺的是

- A.腮腺
- B.下颌下腺
- C.舌下腺
- D.唇腺
- E.磨牙后腺

【答案】A

28.Kappa 值为 0.61~0.80 时可定为

- A.完全不可靠
- B.可靠度不合格
- C.可靠度中等
- D.可靠度优
- E.完全可靠

【答案】D

29.年轻恒牙备洞时敏感的原因是

- A.牙髓疏松,纤维少
- B.硬组织薄,矿化度低
- C.牙本质小管粗大,周围钙化低
- D.磨损少,点隙清楚

E.牙根发育未完成

【答案】C

30.急性牙髓炎的主要病理变化是

- A.淋巴细胞浸润
- B.浆细胞浸润
- C.肉芽组织形成
- D.巨噬细胞浸润
- E.中性粒细胞浸润

【答案】E

31.中度张口受限是指切牙距

- A.小于 1cm
- B.大于 1cm,小于 2cm
- C.大于 2cm,小于 3cm
- D.大于 3cm,小于 4cm
- E.大于 4cm

【答案】B

32.根尖肉芽肿内的上皮成分绝大多数来自

- A.异位的腺上皮
- B.口腔上皮
- C.缩余釉上皮
- D.Malassez 上皮剩余
- E.牙板上皮

【答案】D

33.用于口内消毒的氯己定浓度是

- A.0.1%
- B.0.2%
- C.0.5%
- D.1.0%
- E.1.5%

【答案】A

34.口腔颌面部创伤活动性出血时,最可靠的止血方法是

- A.指压止血
- B.包扎止血
- C.填塞止血
- D.结扎止血
- E.药物止血

【答案】D

35.正常人每日唾液总量为 1000 1500ml,其中腮腺和下颌下腺的分泌量占

- A.75%
- B.80%
- C.85%
- D.90%
- E.95%

【答案】D

36.利多卡因一次最大用量为

- A.10~50mg
- B.80~100mg
- C.300~400mg
- D.800~1000mg
- E.1500mg

【答案】C

37.眶下间隙感染向颅内扩散,并发海绵窦血栓性静脉炎,其扩散途径通常是

- A.面前静脉,颈内静脉
- B.颞浅静脉,内眦静脉
- C.面前静脉,颞浅静脉,颈内静脉
- D.面前静脉,内眦静脉,眼静脉
- E.眶内静脉,面前静脉

【答案】D

38.咬肌间隙感染如未及时切开引流,最常引起的并发症是

- A.败血症
- B.脓毒血症
- C.下颌骨中央性骨髓炎
- D.颈间隙感染
- E.下颌骨边缘性骨髓炎

【答案】E

39.最可能含有静脉石的是

- A.血管瘤
- B.静脉畸形
- C.微静脉畸形
- D.动静脉畸形
- E.混合型脉管畸形

【答案】B

40.舌癌最少发生于

- A.舌侧缘
- B.舌尖
- C.舌背
- D.舌腹
- E.舌根

【答案】D

41.上前牙 3/4 冠邻沟的方向为

- A.与唇面切 1/3 平行
- B.与唇面切 2/3 平行
- C.与唇面龈 2/3 平行
- D.与舌隆突平行
- E.与牙长轴平行

【答案】B

42.关于病例-对照研究特点不包括哪一项

- A.观察时间短
- B.需要研究的对象少
- C.适合研究一些病程较长的慢性病和一些比较多见的疾病
- D.尤其适合那些原因未明疾病的研究
- E.准确性低,可靠性较差,回忆偏倚较大

【答案】C

43.男孩,15岁,因双侧颞下颌关节强直已行颞下颌关节假关节成形术,开始张口训练的时间应是术后

- A.1 天
- B.2~3 天
- C.7~10 天
- D.2 周
- E.1 个月

【答案】C

44.单侧颞下颌关节强直导致面部两侧不对称,具体表现为

- A.颞部偏向患侧,患侧下颌支正常,健侧面部丰满
- B.颞部偏向健侧,患侧下颌支正常,健侧面部丰满
- C.颞部偏向健侧,患侧下颌支正常,患

侧面部丰满

D.颞部偏向患侧,患侧下颌支短小,患侧面部丰满

E.颞部偏向患侧,患侧下颌支短小,健侧面部丰满

【答案】D

45.在深龋中,细菌可以通过暴露的牙本质小管感染牙髓,下列说法正确的是

- A.牙本质厚度<2mm,牙髓内可找到细菌
- B.牙本质厚度<1.1mm,牙髓内可找到细菌
- C.牙本质厚度<0.5mm,牙髓内可找到细菌
- D.牙本质厚度<0.2mm,牙髓内可找到细菌
- E.牙本质厚度<1.5mm,牙髓内可找到细菌

【答案】D

46.面瘫的贝尔征是指

- A.用力紧闭眼睑,则眼球转向外上方
- B.患侧口角下垂,健侧向上歪斜
- C.不能鼓腮、吹气
- D.脸裂过大,闭合不全
- E.下结膜腔内常有泪液积滞

【答案】A

47.隐性唇裂是指

- A.红唇完全裂开
- B.红唇及白唇完全裂开,但鼻底未裂
- C.红唇、白唇及鼻底完全裂开
- D.红唇、白唇、鼻底、牙槽突及腭部全部裂开
- E.红唇、白唇皮肤、黏膜虽完整,但肌肉层连接性中断

【答案】E

48.翼外肌下头的起点为

- A.蝶骨大翼的颞下面和颞下嵴
- B.翼外板的外侧面
- C.蝶骨翼外板的颞面

D. 关节翼肌窝

E. 颞窝及颞深筋膜

【答案】B

49. 在颈部于舌骨大角尖上方发自颈外动脉的分支是

A. 甲状腺上动脉

B. 舌动脉

C. 面动脉

D. 上颌动脉

E. 颞下动脉

【答案】C

50. 汇合成面总静脉的静脉分支是

A. 面前静脉和面后静脉的前支

B. 面前静脉和面后静脉的后支

C. 面前静脉和耳后静脉

D. 面前静脉和颞浅静脉

E. 颞浅静脉和颌内静脉

【答案】A



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM