

## 第三单元

(106~107 题共用题干)

女，22岁。右手及前臂沸水烫伤1小时。查体：右手及前臂红肿明显，有水疱，部分水疱皮脱落，可见创面红白相间。疼痛迟钝。

106. 理论上判断患者烧伤面积占体表面积的百分比是

- A. 5.5%
- B. 4.5%
- C. 3%
- D. 6.5%
- E. 9%

107. 该患者烧伤深度及严重程度分度是

- A. 深Ⅱ°，中度烧伤
- B. 浅Ⅱ°，中度烧伤
- C. 浅Ⅱ°，轻度烧伤
- D. 深Ⅱ°，轻度烧伤
- E. 深Ⅱ°，重度烧伤

(108~110 题共用题干)

男，35岁。纳差、腹胀2个月。查体：浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，肝肋下未触及，脾肋下8.5cm，质硬。化验血常规：Hb 100g/L, WBC  $67.7 \times 10^9/L$ , 原始细胞0.02, 早幼粒细胞0.02, 中幼粒细胞0.08, 分叶核粒细胞0.37, E0.06, B0.09, L0.04, M0.01, Plt  $543 \times 10^9/L$ 。

108. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性早幼粒细胞白血病

- B. 巨幼细胞贫血
- C. 骨髓纤维化
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 慢性淋巴细胞白血病

109. 该患者最可能的染色体改变是

- A. t (8; 16) (p11; p13)
- B. t (9; 22) (q34; q11)
- C. t (9; 21) (q34; q21)
- D. t (8; 21) (q22; q22)
- E. t (15; 17) (q22; q21)

110. 应首选的治疗药物是

- A. 羟基脲，甲磺酸伊马替尼
- B. 亚砷酸，全反式维 A 酸
- C. 苯丁酸氮芥，糖皮质激素
- D. 维生素 B<sub>12</sub>，叶酸
- E. 沙利度胺，红细胞生成素

(111~112 题共用题干)

男，56岁。突发呕血1小时。呕血量约500ml，鲜红色，可见血块，伴大汗、心慌。查体：T36.8°C，P112次/分，R26次/分，BP114/80mmHg。巩膜轻度黄染，肝掌（+），胸壁可见蜘蛛痣，心肺未见明显异常，腹胀，腹肝肋下未触及，脾肋下3cm，移动性浊音（+）。血常规：Hb 95g/L，WBC3.6×10<sup>9</sup>/L，Plt 46×10<sup>9</sup>/L。半年前上消化道X线钡剂造影示食管虫蚀状改变，可见蚯蚓状及串珠状影。

111.该患者上述表现中最有诊断意义的临床特点是

- A.呕血及黑便
- B.上消化道X线钡剂造影示食管中珠样表现
- C.移动性浊音阳性
- D.肝掌及蜘蛛痣
- E.脾大、脾亢

112.如果患者未及时治疗，最易出现的并发症是

- A.急性肾衰
- B.急性肝脓肿
- C.肝性脑病
- D.急性心衰
- E.局限性腹膜炎

(113~115题共用题干)

女，45岁。腹泻10年。精神紧张时加剧，排便前腹痛，排便后腹痛可缓解。大便为糊状，发病以来体重无明显变化。既往体健，平素进食好，睡眠差。查体：T36.5°C，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。未见皮疹，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛。

113.最有可能的诊断是

- A.肠易激综合征
- B.克罗恩病
- C.慢性细菌性痢疾
- D.肠结核
- E.结肠癌

金英杰教育

114.为明确诊断，首选的检查是

- A.结肠镜
- B.全消化道 X 线钡剂造影
- C.腹部 CT
- D.腹部血管造影
- E.小肠镜

115.适宜的治疗措施是

- A.微生态制剂
- B.抗结核治疗
- C.手术治疗
- D.抗生素
- E.糖皮质激素

(116~118 题共用题干)

男，45岁。乏力、纳差、眼黄、尿黄6天入院。病前2个月外出旅游20多天，多在餐馆进餐及进食生冷食物。实验室检查：ALT860U/L,AST 620U/L,TBil 260umol/L,DBil160umol/L, PTA85%。

116.为明确诊断，应追问的病史不包括

- A.饮酒史
- B.服用损肝药物史
- C.输血史
- D.既往肝炎病史

E.宠物接触史

117.如查体发现患者有肝掌，脾大。化验抗 HAV-IgM、抗 HCV、抗 HEV 均 (-) ，HBSAg、HBeAg 及抗 HBC(+)，HBV-DNA $5.1 \times 10^6$ copies/ml。应诊断为

- A.HBSAg 携带者
- B.肝衰竭乙型
- C.HBV 携带者
- D.急性乙型肝炎入胃演确大出血
- E.十二指肠憩大出血
- F.急性胆道大出血
- G.高管胃底曲张静脉破裂
- H.慢性乙型肝炎

118.最重要的治疗是

- A.中药治疗
- B.抗 HBV 治疗
- C.对症治疗
- D.抗肝纤维化治疗
- E.保肝治疗

(119~121 题共用题干)

男，65岁。排便次数增加6个月，伴里急后重、排便不尽感。1个月来大便变细，偶有大便表面带血，自觉乏力，体重减轻4kg。

119.首选的检查方法是

A.粪隐血

B.直肠指检

C.腹部超声

D.结肠镜

E.腹部 CT

120.决定该病人手术方式的要点是

A.是否合并肠周淋巴结转移

B.病灶浸润肠壁的深度

C.病灶下缘距齿状线距离

D.病灶浸润肠壁的周长

E.病灶浸润肠壁的长度

121.该疾病最常见的远处转移部位是

A.脾

B.肝脏

C.骨骼

D.脑

E.肺

(122~124 题共用题干)

女，22岁。突发腹痛12小时。腹痛呈持续性，先以脐部为主，后固定于右下腹，逐渐加重，伴恶心，无呕吐。查体：T37.5°C，P100次/分，R22次/分，BP110/70mmHg。痛苦面容，双肺未闻及啰音，心律齐。腹软，右下腹压痛，无反跳痛，Murphy征阴性，肝脾肋下未触及，肠鸣音减弱。血常规：Hb120g/L，WBC13×10⁹/L，NO.85，Plt200×10⁹/L。拟行手  
金英杰教育

术治疗。122.如腰大肌试验阳性，则术中阑尾最可能的位置是

- A.盆位
- B.回肠前位
- C.盲肠后位
- D.盲肠下位
- E.回肠后位

123.如该患者为妊娠期，以下处理不正确的是

- A.手术切口需偏高
- B.围手术期应加用黄体酮
- C.临产期可行剖宫产同时切除阑尾
- D.常规放置引流管
- E.术后使用广谱抗生素

124.【假设信息】该患者术后 10 天，排便、排尿频繁，伴里急后重感。体温 38.5℃，直肠指诊在直肠前壁触及有波动感的包块，触痛明显。最主要治疗方法是

- A.充分引流
- B.温盐水灌肠
- C.应用抗生素
- D.热水坐浴
- E.物理透热

(125~126 题共用题干)

男，31 岁。双侧臀区交替性疼痛 9 年余，间断腰痛 6 年，疼痛主要发生在夜间，伴有晨僵，

金英杰教育

www.jinyingjie.com

近3周症状加重，有夜间痛能现象。查体：腰部活动受限，右侧“4”字试验阳性。实验室检查：血沉24mm/h，HLA-B27(+)。

125.最可能的诊断是

- A.腰椎间盘突出症
- B.类风湿关节炎
- C.腰椎肿瘤
- D.腰椎管狭窄症
- E.强直性脊柱炎

126.最恰当的治疗是

- A.骨科牵引
- B.骨科手术
- C.口服甲氨蝶呤
- D.休息理疗
- E.口服非甾体抗炎药

(127~128题共用题干)

女，35岁。腹痛、腹胀1个月。伴发热，下午较明显，无寒战，无恶心、呕吐、腹泻。查体：T37.5°C，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹部膨隆，全腹弥漫性压痛，无反跳痛，移动性浊音/(+)。胸部X线检查：右上肺可见钙化灶。

127.应首先考虑的诊断是

- A.肝硬化腹水
- B.心源性腹水
- C.腹膜间皮瘤

金英杰教育

- D.腹膜转移癌
- E.结核性腹膜炎

128.为明确诊断，应首先进行的检查是

- A.PPD 试验
- B.血白蛋白
- C.血常规+血沉
- D.腹腔穿刺及腹水化验
- E.腹部 CT

(129~130 题共用题干)

男，56岁。左臀部注射青霉素后红肿、剧痛伴发热10天。曾作切开排脓，但引流欠畅，改用红霉素，仍发热不退。近2天伴有寒战、弛张型高热、头痛、肩部肿痛。查体：BP10/70mmHg，神志淡漠，唇色苍白。呼吸深快，肺部呼吸音清，未闻及啰音，心率快。左臀切口渗液。血WBC21×10<sup>9</sup>/L。细菌血培养阴性。

129.该患者的主要诊断是

- A.代谢性碱中毒
- B.脓毒症
- C.肺部感染
- D.菌血症
- E.二重感染

130.对该患者不宜采用的治疗措施是

- A.补充血容量
- B.急诊切开排脓

金英杰教育

- C.联合应用抗生素
- D.应用小剂量糖皮质激素
- E.纠正酸碱平衡失调

(131~132 题共用题干)

男，50岁。呕血3小时。晚餐进食粗糙食物后突发呕鲜血，量约600ml。乙肝病史30年，曾有黑便史。查体：T36.5°C，P110次/分，R20次/分，BP110/70mmHg。皮肤未见出血点，可见肝掌。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛，肝肋下未触及，脾肋下2cm。

131.该患者发生呕血最可能的原因是

- A.胃溃疡大出血
- B.十二指肠溃疡大出血
- C.急性胆道大出血
- D.高位胃底曲张静脉破裂
- E.急性腐烂性胃炎

132.患者拟接受手术止血，最主要的处置是

- A.结扎切断胃底贲门周围血管
- B.结扎切断胃十二指肠血管
- C.结扎切断右及左胃网膜血管
- D.结扎切断胃左及胃右动脉
- E.缝合结扎食管旁曲张静脉

(133~134 题共用题干)

女，56岁。右乳头间断血性溢液1年，触及肿物6个月，无疼痛不适。查体：T36.5°C，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg，右腋窝可触及成团融合并固定的淋巴结。心肺腹

查体未见异常。右乳头轻度内陷。按压乳晕周围可见右乳头单孔少量血性溢液，右乳乳晕深面可及 5.5cmx4cm 包块，质硬，边界不清，与胸壁粘连固定。

133.为明确诊断，最佳的检查方法是

- A.乳管镜检查
- B.乳头溢液涂片细胞学检查
- C.乳腺及腋窝超声
- D.乳腺肿物切除活检
- E.乳腺肿物穿刺活检

134.下一步首选的治疗是

- A.术前化疗
- B.右乳单纯乳房切除术
- C.术前放疗
- D.右乳腺癌改良根治术
- E.右乳保留乳房乳腺癌切除术

(135~136 题共用备选答案)

- A.阿奇霉素
- B.青霉素
- C.多西环素
- D.氧氟沙星
- E.头孢曲松

135.孕妇感染梅毒首选的治疗药物是

136.孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选的治疗是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

(137~138 题共用备选答案)

- A.72 小时
- B.24 小时
- C.48 小时
- D.10 小时
- E.2 小时

137. 急性胰腺炎时，血淀粉酶升高达到高峰的时间一般是在发病后

138. 急性胰腺炎时，血脂肪酶开始升高的时间一般是在发病后

(139-140 题共用备选答案)

- A.缺少凝血因子III和X
- B.缺少凝血因子III和V
- C.缺少凝血因子II 和 X
- D.缺少凝血因子VIII或IX
- E.缺少凝血因子IV和VII

139. 血友病患者可能出现的凝血因子异常是

140. 肠切除术后肠瘘长期禁食患者可能出现的凝血因子异常是

(141~142 题共用备选答案)

- A.结肠脾曲
- B.结肠肝曲
- C.直肠和乙状结肠
- D.回首部

金英杰教育

E.全结肠

141.肠结核的好发部位是量

142.溃疡性结肠炎的好发部位是

(143~144题共用备选答案)

A.喹诺酮类药物

B.吡喹酮

C.氯喹

D.奎宁

E.伯氨喹

143.治疗血吸虫病的药物是

144.用于杀灭肝细胞内迟发型疟原虫的药

(145~146题共用备选答案)

A.麻痹性肠梗阻

B.低位肠梗阻

C.痉挛性肠梗阻

D.绞窄性肠梗阻

E.高位肠梗阻

145.持续腹痛血便，肠鸣音消失，有腹膜刺激征的原因是

146.呕吐粪样内容物，腹部高度膨胀的原因是

(147~148题共用备选答案)

A.挤压综合征

金英杰教育

- B.长期饥饿状态
- C.反复呕吐
- D.盐皮质激素过多
- E.长期胃肠减压

147.高钾血症的常见原因是

148.代谢性酸中毒的常见病因是

(149~150题共用备选答案)

- A.腹式呼吸基本消失
- B.腹部压痛最显著的部位
- C.腹肌强直呈板样
- D.右下腹柔软无压痛
- E.腹胀、肠鸣音消失

149.消化性溃疡急性穿孔的典型体征

150.判断弥漫性腹膜炎病因时最有意是