

- A.铁剂
- B.维生素 B<sub>12</sub>
- C.维生素 D
- D.亚叶酸钙
- E.维生素 C

77.女, 35 岁。因下腹痛伴发热 2 天来急诊。查体: T38.9℃, 急性病容。下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张。妇科检查可见脓性阴道分泌物, 宫颈有举痛, 双侧附件区增厚, 有压痛。最可能的诊断是

- A.卵巢囊肿破裂
- B.急性宫颈炎
- C.急性盆腔炎
- D.卵巢囊肿蒂扭转
- E.卵巢囊肿继发感染

78.女, 22 岁。面色苍白 1 年余。既往月经量多 2 年。血常规:  
Hb75g/L, WBC $6.7 \times 10^9/L$ , Plt $220 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查: 增生活跃, 红系增生为主, 中、晚幼红比值增高, 成熟红细胞大小不均, 以小细胞为主, 中心淡染区扩大。首选的治疗是

- A.口服铁剂
- B.补充维生素 B<sub>12</sub>、叶酸
- C.口服雄性激素
- D.口服泼尼松
- E.输注红细胞

79.男, 35 岁。B 超发现右输尿管上段结石, 大小 1.2cm×0.8cm, 合并轻度右肾积水。无发

热，静脉尿路造影（IVU）显示右输尿管上段结石，右肾轻度积水，输尿管显影。首选的治疗方法是

- A. 体外冲击波碎石
- B. 输尿管镜碎石取石
- C. 经皮肾镜碎石取石
- D. 开放输尿管切开取石
- E. 腹腔镜输尿管切开取石

80. 女婴，5 个月。3 天内抽搐 4 次。发作时意识不清，持续 2 分钟，自行缓解，醒后活泼如常，不伴发热。实验室检查：血钙 1.73mmol/L，血镁 1.00mmol/L，血糖 3.9mmol/L。最可能的诊断是

- A. 维生素 D 依赖性佝偻病
- B. 低镁血症
- C. 低血糖症
- D. 婴儿痉挛症
- E. 维生素 D 缺乏性手足抽搐症

81. 女，31 岁。产后 2 个月出现怕脏，担心宝宝被细菌感染，因而反复洗手、反复清洗奶瓶。丈夫下班回来，要求其必须换洗所有衣物。有时出现把宝宝扔出窗外的冲动，但从未真的实施。患者明知这些想法和行为不合理，也试图控制，但没有效果，内心非常痛苦。该患者最可能的诊断为

- A. 抑郁症
- B. 恐惧症
- C. 疑病障碍
- D. 精神分裂症
- E. 强迫障碍

金英杰教育

82.男, 50 岁。反复发作第一跖趾关节红肿热痛 2 年。常于饮酒后出现, 每次持续 1 周左右。既往: 双肾结石 3 年, 高脂血症 5 年。实验室检查: 血尿酸 630 $\mu\text{mol/L}$ , 血肌酐 96 $\mu\text{mol/L}$ 。不宜使用的药物是

- A.布洛芬
- B.苯溴马隆
- C.糖皮质激素
- D.别嘌醇
- E.秋水仙碱

83.女, 35 岁。心悸、消瘦 6 个月, 高热、腹泻、谵语 1 天。查体:  $T40.2^{\circ}\text{C}$ ,  $BP90/60\text{mmHg}$ , 大汗, 甲状腺 II 度肿大, 可闻及血管杂音, 双肺未闻及干湿性啰音, 心率 200 次/分, 心律绝对不齐。应首先考虑的诊断是

- A.甲状腺危象
- B.感染性休克
- C.甲状腺功能亢进症合并肠炎
- D.甲亢性心脏病
- E.急性甲状腺炎

84.男, 45 岁。发现血尿, 蛋白尿 8 年。查体:  $BP150/90\text{mmHg}$ 。实验室检查: 尿蛋白危量 1.2~1.8g/d, 血肌酐 10 $\mu\text{mol/L}$ 。临床诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.肾病综合征
- C.隐匿性肾小球肾炎
- D.高血压肾损害

E.慢性肾小球肾炎

85.男, 65 岁。睡醒后发现右侧肢体无力, 伴言语不利 1 小时。有高血压病史 10 年, 未规律服药治疗。否认有糖尿病及血脂异常史。神经系统查体: 神志清楚, 运动性失语, 右侧肢体肌力 0 级, 两侧痛、温觉对称, 右侧 Babinski 征 (+)。头颅 CT 检查未见异常。最可能的诊断是

A.蛛网膜下腔出血

B.缺血性卒中

C.脑肿瘤

D.脑出血

E.脑炎

86.女, 65 岁。绝经 15 年, 阴道不规则流血 10 余天。高血压、糖尿病病史 10 年。妇科检查: 宫体如 8 周妊娠大小, 质软, 双附件未见异常。应首先考虑的疾病是

A.子宫内膜癌

B.子宫内膜炎

C.子宫腺肌病

D.子宫内膜息肉

B 子宫肌瘤

87.男婴, 3 个月。出生体重 2.8kg, 母乳喂养, 未添加辅食, 食欲好。自出生至今大便 6~8 次/日, 为黄色软便; 无特殊臭味, 经治疗无好转。现体重 5.5kg, 体格检查无异常。最可能的诊断是

A.慢性细菌性痢疾

B.肠结核

C.生理性腹泻

金英杰教育

D.真菌性肠炎

E.迁延型腹泻

88.女, 40岁。双腕、双肘和足趾关节肿胀、疼痛6个月,晨僵大于1小时,活动后减轻。不伴发热、脱发、皮疹及光过敏等。实验室检查:血沉39mm/h,抗环瓜氨酸肽抗体阳性。最可能的诊断是

A.骨关节炎

B.强直性脊柱炎

C.风湿性关节炎

D.痛风性关节炎

E.类风湿关节炎

89.女, 40岁。10年来常出现畏寒、少汗、乏力、纳差,月经不调、便秘,少语少动、表情淡漠,近半年来出现面色部白,眼睑、颊部水肿,反应迟钝,有一过性幻视。患者最可能的诊断是

A.肾上腺皮质功能减退所致精神障碍

B.肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍

C.精神分裂症

D.甲状腺功能低下所致精神障碍

E.甲状腺功能亢进所致精神障碍

90.男, 65岁。左腹股沟可复性斜疝,拟于硬膜外麻醉下手术治疗。自服“阿司匹林”1年。术前需停用阿司匹林的时间至少是

A.2天

B.3天

金英杰教育

www.jinyingjie.com

C.7 天

D.5 天

E.10 天

91.女, 31 岁, 初孕妇。妊娠 36 周, 患糖尿病 2 年, 正规使用胰岛素, 血糖控制良好。胎动正常。超声检查: 胎儿双顶径 9.2cm, 胎盘羊水正常, 胎心率 136 次/分。进一步应采取的处理措施为

A.剖宫产

B.严密监护下继续妊娠

C.前列腺素引产

D.人工破膜

E.静脉滴注催产素引产

92.女, 35 岁。外阴瘙痒, 分泌物增多、性交痛 2 周。妇科检查: 阴道黏膜充血、宫颈充血, 阴道内多量白带, 呈灰黄色、稀薄泡沫状, 臭味。最可能的诊断是

A.外阴阴道假丝酵母菌病

B.滴虫阴道炎

C.细菌性阴道病

D.萎缩性阴道炎

E.非特异性外阴炎

93.女, 22 岁, 初产妇。妊娠 38 周, 规律宫缩 7 小时。检查: 宫口开大 5cm,S=0, 枕左前位, 胎心 148 次/分。预估胎儿体重 2800g。目前应采取的处理是

A.严密观察产程进展

B.静脉推注地西泮

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- C.人工破膜
- D.人工灌肠
- E.静脉滴注缩宫素

94.女，31岁。妊娠28周，阴道脓性分泌物增多3天，诊断为淋病。首选的治疗是

- A.头孢西丁加用红霉素
- B.头孢曲松钠单次肌肉注射
- C.头孢曲松钠加用四环素
- D.头孢西丁单次给药
- E.头孢曲松钠加用喹诺酮类药物

95.女，40岁。1小时前服敌百虫200ml。查体：躁动，瞳孔缩小，四肢强直，肺部可闻及湿啰音。下列处理措施不恰当的是

- A.药物导泻
- B.清洗呕吐物污染的皮肤
- C.静脉应用阿托品
- D.应用解磷定
- E.2%碳酸氢钠溶液洗胃

96.女，22岁。停经40天，阴道少量流血1周。月经规律，周期为28天。有性生活史，曾行人工流产2次。如科检查：子宫稍大，宫颈举痛(+)，左侧附件区可触及5cmx5cm大小包块，质中，压痛(+)为明确诊断，首选的常用辅助检查是

- A.腹腔穿刺
  - B.诊断性刮宫
  - C.宫腔镜检查
- 金英杰教育

- D. 超声检查
- E. 腹腔镜检查

97. 女, 56 岁。绝经 2 年, 阴道不规则流血 1 个月。妇科检查: 外阴正常, 阴道内少量暗红色血, 宫颈光滑。宫体大小正常, 双侧附件区未触及异常。B 超检查: 子宫 5cmx4cmx3cm。子宫内膜厚 10mm, 回声不均。对确定诊断最有价值的处理是

- A. 凝血功能微查
- B. 诊所性刮宫
- C. 血常规检查
- D. 尿妊娠试验
- E. 宫颈细胞学检查

98. 男, 65 岁。右侧肢体运动障碍、失调 12 小时, 但能听懂他人的讲话内容, 能按指示做相应的动作。既往糖尿病病史 10 年, 血糖控制好。高血压病史 15 年, 规则服药治疗, 血压控制在 130/80mmHg 左右。对诊断最有价值的辅助检查是

- A. 颈动脉 B 超
- B. 头颅 CT
- C. 超声心动图
- D. 经颅多普勒超声
- E. 脑电图

99. 女, 50 岁。畏寒、消瘦、食欲减退、便秘、毛发脱落 10 年余。有产后大出血史。查体: 水肿, 皮肤粗糙, 反应迟钝, 心率 56 次/分, 律齐。实验室检查: 血  $FT_3 \downarrow$ , 于  $FT_4 \downarrow$ ,  $TSH \downarrow$ 。考虑主要诊断为

- A. 原发性甲状腺功能减退症
  - B. 垂体瘤
- 金英杰教育

- C. 甲状腺肿瘤
- D. Sheehan 综合征
- E. 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症

100. 女，3岁。右手中指疼痛1个月。查体：中指屈曲，不能伸直，掌指关节掌侧处可触及0.3cm×0.3cm大小硬结，压痛，可随屈肌腱上下活动。首选的治疗方法是

- A. 局部封闭治疗
- B. 手术治疗
- C. 口服非甾体抗炎药
- D. 局部制动
- E. 物理治疗

101. 女，28岁，初产妇。妊娠28<sup>+1</sup>周阵发性腹痛，伴有少许阴道流血1天。查体：T36.5℃，规律宫缩1次/5分钟，持续40秒；宫颈扩张3cm。最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 不全流产
- C. 难免流产
- D. 先兆早产
- E. 先兆流产

102. 男孩，2岁。血常规：Hb45g/L，RBC $2.0 \times 10^{12}/L$ 。该患儿的贫血程度是

- A. 重度贫血
- B. 正常血象
- C. 轻度贫血

- D.中度贫血
- E.极重度贫血

103.女孩，2岁。不会走路和说话。查体：身高65cm，眼裂小，眼距宽，鼻梁低，全身皮肤细嫩，胸骨左缘3-4肋间可闻3/6级收缩期杂音。为明确诊断，首选的检查是

- A.心电图
- B.尿液有机酸分析
- C.血清T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH测定
- D.胸部X线片
- E.染色体核

104.女孩，1岁。诊断为蛋白质-能量营养不良。患儿突然发生面色灰白，神志不清，脉搏减慢，呼吸暂停。应首先考虑

- A.低钠血症
- B.自发性低血糖
- C.继发感染
- D.心力衰竭
- E.低钙血症

105.男，45岁。发热、腹泻2个月，咳嗽4天。T37.6℃~38.8℃，腹泻4~6次/天，水样便，体重下降5kg。有静脉药篇史。实验室检查：血CD4<sup>+</sup>T淋巴细胞减少。最可能的诊断是

- A.慢性细菌性痢疾
  - B.艾滋病
  - C.肺结核
  - D.细菌性肺炎
- 金英杰教育

E.次行性结肠炎

106.女, 28岁。已婚不孕1年。月经量增多、经期延长2年。近1个月出现不规则阴道流血。妇科检查: 宫体增大如2个月妊娠大小。血Hb85g/L。B超检查: 子宫前壁探及3.5cm×1.5cm大小的肌瘤, 完全凸向宫腔。首选的治疗方案是

A.米非司酮药物治疗

B.开腹行肌瘤切除术

C.GnRH-a 药物治疗

D.射频消融术

E.宫腔镜肌瘤切除术

107.男, 45岁, 农民。发热5天, 呕此、腹泻伴少尿1天。查体: 神志清楚, 结膜充血。双腋下可见“搔抓样”出血点。实验室检查:

LWBC $25 \times 10^9/L$ , Plt $30 \times 10^9/L$ , ALT80U/L, TBil45umol/L, 尿蛋白(3+)。最可能的诊断是

A.急性细菌性痢疾

B.肾综合征出血热

C.钩端螺旋体病

D.急性黄疸型肝炎

E.疟疾

108.女, 22岁。咽痛、发热伴咳嗽2周, 颜面水肿3天。查体: BP150/100mmHg, 全身皮肤无皮疹。尿常规: 蛋白(2+)。尿沉渣镜检: RBC20~30/HP。血肌酐115umol/L, 补体C3降低, ASO升高。下列治疗不适宜的是

A.抗生素

B.休息

C.应用激素

金英杰教育

D.利尿

E.控制血压

109. 男, 56 岁。长期大量饮酒 30 年。因母亲去世忙于料理后事而停止饮酒, 2 天后出现不识家人, 不知身在何处, 听见死去的亲人与他说话, 看见房间里有很多蛤蟆。体温 39.5℃, 四肢粗大震颤, 表情惊恐。患者最可能的诊断是

A. 急性应激障碍

B. 酒精性幻觉症

C. 精神分裂症

D. 早老性痴呆

E. 震颤谵妄

第二单元

60.与子宫颈鳞状细胞癌有关的病毒是

A.HBV

B.EBV

C.HPV

D.HIV

E.HCV

61.急性溶血性输血反应的最常见原因是

A.ABO 血型不合的血小板输注

B.ABO 亚型不合的红细胞细胞

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- C.稀有血型不合的红细胞输注
- D.Rh 血型不合的红细胞输注
- E.ABO 血型不合的红细胞输注

62.核酸的基本组成单位是

- A.多核苷酸
- B.核苷
- C.核苷酸
- D.磷酸
- E.核糖

63.女, 45 岁。平素无不适, 无饮酒史。查体: 身高 160m, 体重 79kg, 未见肝掌、蜘蛛痣, ALT38U/L, Glu 8.1mmol/L, 血甘油三酯 3.5mmol/L。B 超提示肝脏轻度肿大, 近场回声弥漫性增强, 远场回声逐渐衰减。患者进行肝穿刺活检, 最可能的病理表现是

- A.结节性肝细胞再生
- B.肝细胞内淤胆
- C.假小叶形成
- D.肝细胞脂肪变性
- E.肝细胞桥接坏死

64.男, 31 岁, 饮酒后上腹痛 20 小时, 呕吐后疼痛不减轻。查体, 在上腹压痛, 无肌紧张, 血淀粉酶 820U/L。最可能的诊断是

- A.急性胰腺炎
  - B.急性肠梗阻
  - C.急性胆囊炎
- 金英杰教育

D.急性肝炎

E.急性胃炎

65.女，45岁。回肠及部分空肠切除术后出现排稀水样便，每日10余次，进食后加重。腹泻的主要原因是

A.肠道感染

B.吸收不良

C.肠道细菌过度生长

D.肠蠕动加快

E.分泌增加

66.男，28岁。从5米高处坠落受伤1小时。面色苍白，腹部疼痛难忍。查体：P120次/分，BP 80/60mmHg，神志清楚，全腹压痛，肌紧张(+)，诊断性腹腔穿刺抽出不凝血，首选的处理措施是

A.给予止痛药物缓解疼痛

B.给予缩血管药物升高血压

C.纠正体位，手术剖腹检查

D.胃肠减压，密切观察

E.广谱抗生素感染治疗

67.女，71岁。2型糖尿病病史8年，瑞格列奈2mg tid，近期血糖控制不佳，既往高血压病史10年，冠心病病史5年，身高158cm，体重50kg，BMI 20kg/m<sup>2</sup>。实验室检查：空腹血糖12.5mmol/L，三餐后2小时血糖分别为7.8mmol/L、8.4mmol/L和8.8mmol/L，夜间血糖10.5mmol/L，糖化血红蛋白9.2%。目前最适宜的治疗是加用

A.长效胰岛素

B.噻唑烷二酮降糖药

金英杰教育

www.jinyingjie.com

C.a-葡萄糖苷酶抑制药

D.磺脲类降糖药

E.双胍类降糖药

68.男, 50 岁。高热伴进行性呼吸困难 4 天, 既往体健, 查体: T39.4℃, R32 次/分。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音。胸部 CT 示双肺弥漫分布的磨玻璃影, 血 WBC $8.5 \times 10^9/L$ , CRP24mg/L, SpO<sub>2</sub>88%。患者最可能感染的病原体是

A.肺孢子菌

B.肺炎支原体

C.病毒

D.结核分枝杆菌

E.军团菌

69.男, 65 岁。胸骨后不适 6 个月, 进行性吞咽困难 2 个月, 体重减轻 5kg。对明确诊断最有意义的检查是

A.胸部 CT

B.上消化道 X 线钡剂造影

C.胃镜

D.心电图

E.腹部 B 超

70.女, 65 岁。反复发作劳累时胸骨后疼痛 2 年, 合用硝酸甘油和普萘洛尔抗心肌缺血的机制不包括

A.普萘洛尔对抗硝酸甘油引起的反射性心率加快

B.协同降低心肌耗氧量

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- C.普萘洛尔可缩小硝酸甘油所致的心容积增加
- D.增加冠脉供血、降低心肌耗氧
- E.共同降低心脏做功

71.100 名高血压患者接受某种药物治疗，1 个月后有 65 名患者血压明显下降，正确的说法为

- A.观察时间短，疗效可疑
- B.样本量小，尚不能作结论
- C.未设对照组，无法作结论
- D.该药物降压效果好
- E.该药物无降压效果

72.男，50 岁。凌晨 2 点左右突发胸痛。查体：心界不大，心率 75 次/分，律齐，心脏未闻及杂音。发作时心电图呈 II、III、aVF 导联 ST 段抬高，约 20 分钟后恢复常。该患者最可能的诊断是

- A.初发劳力型心绞痛
- B.变异型心绞痛
- C.急性下壁心肌梗死
- D.恶化劳力型心绞痛
- E.稳定型心绞痛

73.女，65 岁。慢性心力衰竭 5 年，胸闷、乏力、下肢水肿加重 1 周就诊，服用强心、利尿剂后症状改善。用药后水肿改善的原因是

- A.血浆胶体渗透压降低
- B.毛细血管后阻力增高

- C. 毛细血管血压降低
- D. 毛细血管前阻力增高
- E. 血浆晶体渗透压升高

74. 男, 35 岁。腹腔镜胆囊切除术后 5 天。腹胀伴皮肤黄染、粪便呈陶土样 1 天。查体: T36.5°C, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg, 皮肤、巩膜黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 右上腹轻度压痛, 无反跳痛, 移动性浊音(一)。最可能的原因是

- A. 胃损伤
- B. 结肠肝曲损伤
- C. 胆囊管残端漏
- D. 十二指肠损伤
- E. 胆总管损伤

75. 某年某社区年初人口数 8500 人, 年末人口数 11500 人。年末有糖尿病人 136 人, 该年内有 12 名患者死于糖尿病并发症。则该社区普查当年的糖尿病患病率为

- A. 148/11500
- B. 124/10000
- C. 136/8500
- D. 148/10000
- E. 136/11500

76. 女, 31 岁。咳嗽 2 个月, 发热、胸闷 1 周。查体: T38.5°C, 右下肺叩诊实音, 呼吸音消失。胸部 X 线片示右下肺大片致密影, 上缘呈弧形。该患者应首选的检查是

- A. 胸部超声

- B.痰找抗酸杆菌
- C.支气管镜
- D.胸部 CT
- E.痰培养+药敏

77.男，40岁。咳嗽、咳痰半年，加重1周。无发热、盗汗、消瘦。查体：浅表淋巴结未触及，右上肺散在湿啰音。为明确诊断，应首选的检查是

- A.痰涂片找抗酸杆菌
- B.动脉血气分析
- C.痰涂片+药敏
- D.肺功能
- E.胸部 X 线片

78.某吸烟者，烟龄15年，尼古丁依赖评分为高成瘾性，且以往尝试戒烟后出现明显戒断症状。经医生劝说后决定本周日起戒烟，对于此吸烟者应立即采取的措施为

- A.采用 5R 动机访谈
- B.宣传戒烟的好处
- C.强制戒烟
- D.提供戒烟方法咨询，必要时推荐戒烟药物
- E.约定随访日期

79.女，45岁。右乳头糜烂3个月。查体：右乳头皮肤表面结痂，去除痂皮可见鲜红色创面，触之易出血。协助确诊的最佳检查是

- A.乳腺空芯针穿刺活检
  - B.乳腺超声
- 金英杰教育

C. 乳腺钼靶

D. 乳头刮片细胞学检查

E. 乳腺 MRI

80. 某中年男性，因胸闷不适就诊，诊断为冠心病。经询问，患者吸烟。医生告知患者“你想戒烟吗？”这属于 5A 戒烟法中的哪一步骤

A. 评估吸烟者的戒烟意愿

B. 提供行为查询治疗

C. 安排随访

D. 建议吸烟者戒烟

E. 询问吸烟情况

81. 女，28 岁，在与恋人的一次激烈争吵之后，倍感气愤、烦闷，次晨出现双下肢瘫痪、无法起立行走的症状，经查无神经系统器质性病变的临床依据。如欲对该患者实施尝试性心理治疗，首选的方法为

A. 放松训练

B. 暗示疗法

C. 自由联想

D. 认知疗法

E. 支持疗法

82. 男，45 岁，上都间断疼痛 10 余年。多于用餐后半小时出现上腹饱胀、疼痛。平素常有反酸，嗝气，偶有大便颜色发黑。近半年来疼痛指不规律，餐前、餐后均可发生。能够进行确诊的检查是

A. 超声内镜

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- B.腹部 CT
- C.腹部 MRI
- D.上消化道 X 线钡剂造影
- E.胃镜及组织活检病理

83.男, 71 岁。饮酒、饱餐后剧烈胸痛 2 小时, 呕吐 2 次, 初为进食的食物, 后呕出物为浅咖啡色胃内容物。心电图示 II、III、aVF 导联 T 波高尖, 既往有糖尿病和高血压病史 10 年, 该患者最可能的诊断是

- A.胃穿孔
- B.急性胃扩张
- C.急性心肌梗死
- D.急性胃肠炎
- E.胃溃疡

84.女, 45 岁。黑便、头晕 1 个月入院, 入院诊断上消化道出血。入院当日给予输注悬浮红细胞 2 单位, 输血开始后 15 分钟, 患者突然出现寒战、发热、腰背疼痛、呼吸困难、胸闷, 发绀、多汗, 查体: T39.9°C, BP90/60mmHg, 脉细弱。经治疗后发现尿液呈酱油色。患者发生的输血不良反应是

- A.细菌污染反应
- B.输血相关急性肺损伤
- C.严重过敏反应
- D.输血相关循环超负荷
- E.急性溶血反应

85.男, 65 岁。活动后心悸、胸痛 1 年。查体: BP140/50mmHg。双侧桡动脉脉搏骤起骤落, 双肺呼吸音清, 心率 84 次/分, 律齐, 胸骨左缘第 3 肋间可闻及舒张期叹气样杂音。该患

金英杰教育

www.jinyingjie.com

者最可能的诊断是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

86. 女, 31 岁。平素无不适。体检发现血压 110/70mmHg, 心率 84 次/分, 律不齐, 可闻及期前收缩 4 次/分。心电图示室性期前收缩。超声心动图示心脏结构功能正常。应采取的措施是

- A. 普罗帕酮治疗
- B. 利多卡因治疗
- C. 随访, 暂无须药物治疗
- D. 胺碘酮治疗
- E. 索他洛尔治疗

87. 男, 50 岁, 在侧胸痛伴气短 1 个月。吸烟 30 年, 20 支/天。查体: 左侧胸部叩诊呈实音, 左下肺呼吸音低, 胸部 X 线片示左侧中等量胸腔积液伴左肺门阴影增大。胸腔积液检查: 蛋白 36g/L, 单核细胞 0.72, ADA16U/L, 胸水 CEA15ug/L。该患者最可能的诊断是

- A. 肺癌胸膜转移
- B. 淋巴瘤胸膜受累
- C. 结核性胸腔积液
- D. 类肺炎性胸腔积液
- E. 结节病合并胸腔积液

88.女，22岁。左颈前肿物2个月，无不适，查体：甲状腺左叶可触及2cm肿物，质硬。超声提示甲状腺左叶2.4cm×1.6cm实性肿物，血流丰富，内有细小钙化灶。能够确诊的检查是

- A.血清T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH检测
- B.颈部CT
- C.血清肿瘤标志物检测
- D.甲状腺核素显像
- E.穿刺细胞学检查

89.女，75岁。发热、咳嗽3天，意识模糊1天。近2天尿量明显减少。慢性阻塞性肺疾病病史20年，糖尿病病史10年。查体：T38.5℃，P102次/分，R24次/分，BP145/90mmHg。面色潮红，球结膜水肿，双侧瞳孔等大等圆，对光反射迟钝，口唇发绀。双肺呼吸音低，可闻及痰鸣音。心率102次/分，各瓣膜听诊区未闻及杂音。双下肢轻度水肿。该患者应首先考虑的诊断是

- A.急性脑血管病
- B.肺性脑病
- C.高渗昏迷
- D.尿毒症所致意识障碍
- E.电解质紊乱

90.男，65岁，活动时胸痛1年。症状每于重体力劳动时发作，停止活动后3分钟左右自行缓解。能改善其预后的治疗措施

- A.速效救心丸
- B.阿司匹林
- C.硝酸甘油
- D.硝苯地平

E.定期输注丹多酮

91. 某医疗机构 1 周内收治多名患手足口模的小学生，未按规定履行报告职责，也未及时采取控制措施，致使疫情扩散。县卫生行政部门得知此情况后立即启动应会预案，及时控制了疫情，同时对事件进行调查，认为该医疗机构行为违法且情节严重，依法做出了处理。该处理是

A.责令改正

B.吊销《医疗机构执业许可证》

C.给予警告

D.暂停执业活动

E.通报批评

92.男，31 岁。咳嗽 3 年。以春秋季节为著，无发热，自行服用抗生素后症状逐渐减轻，胸部 X 线片未见异常。2 天前再次发作，伴憋气。查体未见明显异常。行常规肺功能检查示通气功能正常。为进一步明确诊断，应首选的检查是

A.痰嗜酸性粒细胞计数

B.皮肤过敏原试验

C.支气管镜

D.支气管激发试验

E.胸部 CT

93.女，28 岁，咯血伴少尿 3 天。查体：T36.8℃,P74 次/分，BP160/100mmHg。颜面及双下肢水肿。实验室检查：尿红细胞（2+），血尿素 10.5mmol/L，血肌酐 185umol/L，B 超示双肾体积增大，该患者最可能的病理诊断是

A.新月体性肾小球肾炎

B.急性肾盂肾炎

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- C.微小病变性肾病
- D.膜性肾病
- E.系膜增生性肾小球肾炎

94. 女, 45 岁。反复发作进食油腻食物后右上腹疼痛 2 年, 影响生活, 近半年控制饮食后发作次数减少, 最近一次发作是 3 个月前, 超声检查发现胆囊结石, 胆囊缩小, 囊壁增厚、粗糙, 该患者首选的治疗方法是

- A.胆囊切除术
- B.口服消炎利胆药物
- C.体外碎石
- D.胆肠吻合术
- E.胆囊造瘘术

95. 男, 28 岁。背部刀刺伤 1 小时急诊。查体: P100 次/分, R25 次/分, BP90/60mmHg, 面色略苍白, 左侧脊柱旁可见长约 3cm 伤口, 有空气进出声响, 未见血液外溢。胸部 X 线片可见少量液气胸。此时最佳处理措施是

- A.清创缝合
- B.开胸探查
- C.封闭伤口, 胸腔闭式引流
- D.气管插管、呼吸机支持
- E.吸氧

96. 男, 35 岁。2 个月前因风湿性心脏病主动脉瓣狭窄并关闭不全行主动脉瓣膜置换术, 术后 30 天出现发热, 体温波动于 38°C~39°C。查体: 主动脉瓣听诊区可闻及舒张期杂音, 脾大。两次血培养均 (+)。该患者最可能的诊断是

- A.感染性心内膜炎
- 金英杰教育

- B.术后吸收热
- C.结核病
- D.肺部感染
- E.急性风湿热

97.男, 56岁。上腹不适6年, 上腹痛伴早饱、暖气2个月, 口服法莫替丁后腹痛减轻, 胃镜及胃黏膜活组织病理检查提示胃窦重度慢性萎缩性胃炎伴轻度异型增生,  $^{13}\text{C}$  尿素呼气试验阳性。最适宜的处理措施是

- A.口服多潘立酮及消化酶, 定期复查胃镜
- B.口服黏膜保护剂及消化酶, 定期复查胃镜
- C.口服奥美拉唑, 定期复查胃镜
- D.根除幽门螺杆菌, 定期复查胃镜
- E.胃大部切除术, 术后根除幽门螺杆菌

98.某医师给住院患者开具了药物医嘱后, 很快发现自己的医嘱有误, 但判断其不会给患者造成严重后果。此时该医师的最佳做法是

- A.纠正医嘱, 并对出现的失误予以积极补救
- B.先不告知患者, 若其知晓再为自己的失误辩护
- C.不告知其他人, 对患者进行密切观察
- D.不告知患者失误的实情, 后续治疗中适当弥补
- E.失误不会造成严重后果, 可隐瞒以避免纠纷

99.女, 22岁, 医学生, 最近与男友发了激烈的争执, 以致数两人分手, 情绪极度低落, 也十分愤恨, 来找学校心理咨询师寻求帮助。心理咨询师针对其情绪的调节提出的办法中不适合的是

- A. 降低期望
- B. 放松训练
- C. 改变认知
- D. 不断宣泄
- E. 心理应对

100. 女, 65 岁。持续性胸痛 5 小时。查体: BP85/55mmHg, 心率 50 次/分, 心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段抬高 0.3mV。以下药物最恰当的是

- A. 硝酸甘油
- B. 卡托普利
- C. 地尔硫卓
- D. 奥托洛尔
- E. 阿司匹林

101. 男。50 岁。肝功能异常 15 年, 乏力、间断双下肢水肿 7 年, 低热、消瘦、肝区隐痛 3 个月。最有诊断意义的实验室检查

- A. 7-谷氨酰转移酶
- B. 癌胚抗原
- C. 总胆红素
- D. 甲胎蛋白
- E. 丙氨酸氨基转移酶

102. 男, 56 岁。喘憋伴下肢水肿 3 个月。查体: BP150/70mmHg, 高枕卧位, 颈静脉怒张, 双肺可闻及大量湿啰音, 心脏向左下扩大, P<sub>2</sub>亢进, 心率 90 次分, 律齐, 肝肋下 3cm 可触及, 肝颈静脉回流征阳性, 双下肢凹陷性水肿, 该患者最恰当的诊断

- A.右心衰竭
- B.全心衰竭
- C.急性肺血栓栓塞
- D.哮喘急性发作
- E.左心衰竭

103.女,65岁。子宫内股落术后5天。突发左下肢肿胀、疼痛1小时。包大腿和小腿印胀,皮温路高,左隧股构区压痛,足背动脉搏动存在。正确的治疗措施是

- A.绝对卧床
- B.左下肢按摩
- C.口服镇痛药
- D.嘱病人主动活动左下肢
- E.静脉输注抗生素

104.男,65岁。突发呕鲜血4小时,量约1000ml。查体:重度贫血貌,可见肝掌、蜘蛛痣。肝肋下未触及,脾肋下2cm。最可能的呕血原因是

- A.食管贲门黏膜撕裂综合征
- B.食管胃底静脉曲张破裂
- C.胃癌
- D.消化性溃疡
- E.急性糜烂出血性胃炎

105.某人被狂犬咬伤,医生给予的处理是清理伤口、接种狂犬疫苗和抗狂犬病血清。对该患者的免疫接种属于

- A.人工自动免疫
- 金英杰教育

- B. 自然被动免疫
- C. 人工被动免疫
- D. 自然自动免疫
- E. 被动自动免疫

106.男, 65 岁。1 年前因胃腺癌行胃癌根治术及术后化疗, 患者近期出现极度消瘦, 眼窝深陷, 皮肤干燥松弛, 肋骨凸显。符合该患者表现的是

- A. 去神经性萎缩
- B. 老化性萎缩
- C. 失用性萎缩
- D. 营养不良性萎缩
- E. 压迫性萎缩

107.按, 22 岁。发热伴胸间、气短 1 周入院、前部 X 线片示左侧大量胸腔积液。其气短的最主要的原因是

- A. 动-静脉分流
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 阻塞性通气功能障碍
- D. 呼吸膜通透性降低
- E. 通气/血流比例失调

108.男, 45 岁。平素体健 2 前因四肢多发伤行手术治疗, 4 小时前排柏油样便约 100g。粪隐血 (+)。最可能的诊断是

- A. 食管贲门黏膜撕裂综合征
  - B. 反流性食管炎
- 金英杰教育

- C.胃癌
- D.十二指肠溃疡
- E.急性糜烂出血性胃炎

109.男，18岁。剧烈活动后突发右侧胸痛伴喘憋5小时。查体：右胸叩诊呈鼓音，右侧呼吸音减弱。最可能的诊断是

- A.自发性支气管破裂
- B.自发性血胸
- C.自发性食管破裂
- D.自发性气胸
- E.自发性纵隔气肿

110.男，19岁。约2周前曾感嗽、流涕，近3天感心悸，查体：心界不大，心率96次/分，律不齐，可闻及期前收缩大于10次/分。心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音和附加音。心电图示室性期前收缩。血清肌钙蛋白升高，该患者最可能的诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.急性心包炎
- C.扩张型心肌病
- D.感染性心内膜炎
- E.病毒性心肌炎

111.男，65岁，上腹隐痛3个月，向背部放射，腹痛逐渐加重并影响睡眠，蜷曲位略减轻。1周前发现皮肤巩膜黄染，无发热。应首先考虑的诊断是

- A.胃癌
- B.胰腺癌

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- C.肝癌
- D.胆结石伴胆道梗阻
- E.胆囊癌

112.女, 35岁。因右侧胸腔积液给予规律三联试验性抗结核治疗2个月, 近2天出现视力异常。导致上述表现最可能的原因是

- A.利福平不良反应
- B.乙胺丁醇不良反应
- C.类赫氏反应
- D.异烟肼不良反应
- E.溶血尿毒综合征

113.女, 60岁。里急后重, 便意频繁半年, 有排便不尽感。近2个月大便变细。为协助诊断, 首先要做的检查是

- A.直肠镜检查
- B.直肠指诊
- C.下消化道造影
- D.经直肠超声
- E.盆腔增强CT