

第三单元

(106~107 题共用题干)

女, 22 岁。右手及前臂沸水烫伤 1 小时。查体: 右手及前臂红肿明显, 有水疱, 部分水疱皮脱落, 可见创面红白相间。疼痛迟钝。

106. 理论上判断患者烧伤面积占体表面积百分比是

- A. 5.5%
- B. 4.5%
- C. 3%
- D. 6.5%
- E. 9%

107. 该患者烧伤深度及严重程度分度是

- A. 深 II°, 中度烧伤
- B. 浅 II°, 中度烧伤
- C. 浅 II°, 轻度烧伤
- D. 深 II°, 轻度烧伤
- E. 深 II°, 重度烧伤

(108~110 题共用题干)

男, 35 岁。纳差、腹胀 2 个月。查体: 浅表淋巴结未触及, 巩膜无黄染, 肝肋下未触及, 脾肋下 8.5cm, 质硬。化验血常规: Hb 100g/L, WBC  $67.7 \times 10^9/L$ , 原始细胞 0.02, 早幼粒细胞 0.02, 中幼粒细胞 0.08, 分叶核粒细胞 0.37, E0.06, B0.09, L0.04, M0.01, Plt  $543 \times 10^9/L$ 。

108. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性早幼粒细胞白血病

- B. 巨幼细胞贫血
- C. 骨髓纤维化
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 慢性淋巴细胞白血病

109. 该患者最可能的染色体改变是

- A.  $t(8; 16)(p11; p13)$
- B.  $t(9; 22)(q34; q11)$
- C.  $t(9; 21)(q34; q21)$
- D.  $t(8; 21)(q22; q22)$
- E.  $t(15; 17)(q22; q21)$

110. 应首选的治疗药物是

- A. 羟基脲，甲磺酸伊马替尼
- B. 亚砷酸，全反式维 A 酸
- C. 苯丁酸氮芥，糖皮质激素
- D. 维生素 B<sub>12</sub>，叶酸
- E. 沙利度胺，红细胞生成素

(111~112 题共用题干)

男，56 岁。突发呕血 1 小时。呕血量约 500ml，鲜红色，可见血块，伴大汗、心慌。查体：T36.8℃，P112 次/分，R26 次/分，BP114/80mmHg。巩膜轻度黄染，肝掌(+)，胸壁可见蜘蛛痣，心肺未见明显异常，腹胀，腹肝肋下未触及，脾肋下 3cm，移动性浊音(+)。血常规：Hb 95g/L，WBC $3.6 \times 10^9/L$ ，Plt  $46 \times 10^9/L$ 。半年前上消化道 X 线钡剂造影示食管虫蚀状改变，可见蚯蚓状及串珠状影。

111. 该患者上述表现中最有诊断意义的临床特点是

- A. 呕血及黑便
- B. 上消化道×线钡剂造影示食管中珠样表现
- C. 移动性浊音阳性
- D. 肝掌及蜘蛛痣
- E. 脾大、脾亢

112. 如果患者未及时治疗，最易出现的并发症是

- A. 急性肾衰
- B. 急性肝脓肿
- C. 肝性脑病
- D. 急性心衰
- E. 局限性腹膜炎

(113~115 题共用题干)

女，45岁。腹泻10年。精神紧张时加剧，排便前腹痛，排便后腹痛可缓解。大便为糊状，发病以来体重无明显变化。既往体健，平素进食好，睡眠差。查体：T36.5℃，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。未见皮疹，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，无压痛。

113. 最有可能的诊断是

- A. 肠易激综合征
- B. 克罗恩病
- C. 慢性细菌性痢疾
- D. 肠结核
- E. 结肠癌

金英杰教育

www.jinyingjie.com

114.为明确诊断，首选的检查是

- A.结肠镜
- B.全消化道 X 线钡剂造影
- C.腹部 CT
- D.腹部血管造影
- E.小肠镜

115.适宜的治疗措施是

- A.微生态制剂
- B.抗结核治疗
- C.手术治疗
- D.抗生素
- E.糖皮质激素

(116~118 题共用题干)

男，45 岁。乏力、纳差、眼黄、尿黄 6 天入院。病前 2 个月外出旅游 20 多天，多在餐馆进餐及进食生冷食物。实验室检查：ALT860U/L,AST 620U/L,TBil 260umol/L,DBil160umo/L,PTA85%。

116.为明确诊断，应追问的病史不包括

- A.饮酒史
- B.服用损肝药物史
- C.输血史
- D.既往肝炎病史

E. 宠物接触史

117. 如查体发现患者有肝掌，脾大。化验抗 HAV-IgM、抗 HCV、抗 HEV 均 (-)，

HBSAg、HBeAg 及抗 HBC(+)，HBV-DNA $5.1 \times 10^6$ copies/ml。应诊断为

A. HBSAg 携带者

B. 肝衰竭乙型

C. HBV 携带者

D. 急性乙型肝炎入

胃演确大出血

B. 十二指腾演绪大出血

C. 急性胆道大出血

D. 高管胃底曲张静脉破裂

E. 慢性乙型肝炎

118. 最重要的治疗是

A. 中药治疗

B. 抗 HBV 治疗

C. 对症治疗

D. 抗肝纤维化治疗

E. 保肝治疗

(119~121 题共用题干)

男，65 岁。排便次数增加 6 个月，伴里急后重、排便不尽感。1 个月来大便变细，偶有大便表面带血，自觉乏力，体重减轻 4kg。

金英杰教育

www.jinyingjie.com

119. 首选的检查方法是

- A. 粪隐血
- B. 直肠指检
- C. 腹部超声
- D. 结肠镜
- E. 腹部 CT

120. 决定该病人手术方式的要点是

- A. 是否合并肠周淋巴结转移
- B. 病灶浸润肠壁的深度
- C. 病灶下缘距齿状线距离
- D. 病灶浸润肠壁的周长
- E. 病灶浸润肠壁的长度

121. 该疾病最常见的远处转移部位是

- A. 脾
- B. 肝脏
- C. 骨骼
- D. 脑
- E. 肺

(122~124 题共用题干)

女, 22 岁。突发腹痛 12 小时。腹痛呈持续性, 先以脐部为主, 后固定于右下腹, 逐渐加重, 伴恶心, 无呕吐。查体: T37.5℃, P100 次/分, R22 次/分, BP110/70mmHg。痛苦面

金英杰教育

www.jinyingjie.com

容，双肺未闻及啰音，心律齐。腹软，右下腹压痛，无反跳痛，Murphy 征阴性，肝脾肋下未触及，肠鸣音减弱。血常规：Hb120g/L，WBC $13 \times 10^9/L$ ，N0.85，Plt $200 \times 10^9/L$ 。拟行手术治疗。122.如腰大肌试验阳性，则术中阑尾最可能的位置是

- A.盆位
- B.回肠前位
- C.盲肠后位
- D.盲肠下位
- E.回肠后位

123.如该患者为妊娠期，以下处理不正确的是

- A.手术切口需偏高
- B.围手术期应加用黄体酮
- C.临产期可行剖宫产同时切除阑尾
- D.常规放置引流管
- E.术后使用广谱抗生素

124.【假设信息】该患者术后 10 天，排便、排尿频繁，伴里急后重感。体温  $38.5^{\circ}\text{C}$ ，直肠指诊在直肠前壁触及有波动感的包块，触痛明显。最主要的治疗方法是

- A.充分引流
- B.温盐水灌肠
- C.应用抗生素
- D.热水坐浴
- E.物理透热

(125~126 题共用题干)

金英杰教育

www.jinyingjie.com

男，31岁。双侧臀区交替性疼痛9年余，间断腰痛6年，疼痛主要发生在夜间，伴有晨僵，近3周症状加重，有夜间痛醒现象。查体：腰部活动受限，右侧“4”字试验阳性。实验室检查：血沉24mm/h，HLA-B27(+)。

125.最可能的诊断是

- A.腰椎间盘突出症
- B.类风湿关节炎
- C.腰椎肿瘤
- D.腰椎管狭窄症
- E.强直性脊柱炎

126.最恰当的治疗是

- A.骨科牵引
- B.骨科手术
- C.口服甲氨蝶呤
- D.休息理疗
- E.口服非甾体抗炎药

(127~128 题共用题干)

女，35岁。腹痛、腹胀1个月。伴发热，下午较明显，无寒战，无恶心、呕吐、腹泻。查体：T37.5℃，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹部膨隆，全腹弥漫性压痛，无反跳痛，移动性浊音/(+)。胸部X线检查：右上肺可见钙化灶。

127.应首先考虑的诊断是

- A.肝硬化腹水
- B.心源性腹水

- C.腹膜间皮瘤
- D.腹膜转移癌
- E.结核性腹膜炎

128.为明确诊断，应首先进行的检查是

- A.PPD 试验
- B.血白蛋白
- C.血常规+血沉
- D.腹腔穿刺及腹水化验
- E.腹部 CT

(129~130 题共用题干)

男，56岁。左臀部注射青霉素后红肿、剧痛伴发热10天。曾作切开排脓，但引流欠畅，改用红霉素，仍发热不退。近2天伴有寒战、弛张型高热、头痛、肩部肿痛。查体：BP10/70mmHg，神志淡漠，唇色苍白。呼吸深快，肺部呼吸音清，未闻及啰音，心率快。左臀切口渗液。血 WBC $21 \times 10^9/L$ 。细菌血培养阴性。

129.该患者的主要诊断是

- A.代谢性碱中毒
- B.脓毒症
- C.肺部感染
- D.菌血症
- E.二重感染

130.对该患者不宜采用的治疗措施是

- A.补充血容量
- 金英杰教育

- B.急诊切开排脓
- C.联合应用抗生素
- D.应用小剂量糖皮质激素
- E.纠正酸碱平衡失调

(131~132 题共用题干)

男, 50 岁。呕血 3 小时。晚餐进食粗糙食物后突发呕鲜血, 量约 600ml。乙肝病史 30 年, 曾有黑便史。查体: T36.5℃, P110 次/分, R20 次/分, BP110/70mmHg。皮肤未见出血点, 可见肝掌。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm。

131. 该患者发生呕血最可能的原因是

- A.胃溃疡大出血
- B.十二指肠溃疡大出血
- C.急性胆道大出血
- D.食管胃底静脉曲张破裂
- E.急性糜烂性胃炎

132. 患者拟接受手术止血, 最主要的处置是

- A.结扎切断胃底贲门周围血管
- B.结扎切断胃十二指肠血管
- C.结扎切断右及左胃网膜血管
- D.结扎切断胃左及胃右动脉
- E.缝合结扎食管旁曲张静脉

(133~134 题共用题干)

女, 56 岁。右乳头间断血性溢液 1 年, 触及肿物 6 个月, 无疼痛不适。查体: T36.5℃,  
金英杰教育

P80 次/分，R18 次/分，BP120/80mmHg，右腋窝可触及成团融合并固定的淋巴结。心肺腹查体未见异常。右乳头轻度内陷。按压乳晕周围可见右乳头单孔少量血性溢液，右乳乳晕深面可及 5.5cmx4cm 包块，质硬，边界不清，与胸壁粘连固定。

133.为明确诊断，最佳的检查力法是

- A.乳管镜检查
- B.乳头溢液涂片细胞学检查
- C.乳腺及腋窝超声
- D.乳腺肿物切除活检
- E.乳腺肿物穿刺活检

134.下一步首选的治疗是

- A.术前化疗
- B.右乳单纯乳房切除术
- C.术前放疗
- D.右乳腺癌改良根治术
- E.右乳保留乳房乳腺癌切除术

(135~136 题共用备选答案)

- A.阿奇霉素
- B.青霉素
- C.多西环素
- D.氧氟沙星
- E.头孢曲松

135.孕妇感染梅毒首选的治疗药物是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

136. 孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选的治物是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 72 小时
- B. 24 小时
- C. 48 小时
- D. 10 小时
- E. 2 小时

137. 急性胰腺炎时，血淀粉酶升高达到高峰的时间一般是在发病后

138. 急性胰腺炎时，血脂肪酶开始升高的时间一般是在发病后

(139-140 题共用备选答案)

- A. 缺少凝血因子 III 和 X
- B. 缺少凝血因子 III 和 V
- C. 缺少凝血因子 II 和 X
- D. 缺少凝血因子 VIII 或 IX
- E. 缺少凝血因子 IV 和 VII

139. 血交病患者可能出现的凝血因子异常是

140. 肠切除术后肠痿长期禁食患者可能出现的凝血因子异常是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 结肠脾曲
- B. 结肠肝曲
- C. 直肠和乙状结肠

金英杰教育

- D.回首部
- E.全结肠

141.肠结核的好发部位是

142.溃疡性结肠炎的好发部位是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 喹诺酮类药物
- B. 吡喹酮
- C. 氯喹
- D. 套宁
- E. 伯氨喹

143.治疗血吸虫病的药物是

144.用于杀灭肝细胞内迟发型疟原虫的药

(145-146 题共用备选答案)

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 低位肠梗阻
- C. 痉挛性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 高位肠梗阻

145.持续腹痛血便，肠鸣音消失，有腹膜刺激征的原因是

146.呕吐粪样内容物，腹部高度膨胀的原因是

(147~148 题共用备选答案)

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A. 挤压综合征
- B. 长期饥饿状态
- C. 反复呕吐
- D. 盐皮质激素过多
- E. 长期胃肠减压

147. 高钾血症的常见原因是

148. 代谢性酸中毒的常见病因是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 腹式呼吸基本消失
- B. 腹部压痛最显著的部位
- C. 腹肌强直呈板样
- D. 右下腹柔软无压痛
- E. 腹胀、肠鸣音消失

149. 消化性溃疡急性穿孔的典型体征

150. 判断弥漫性腹膜炎病因时最有意是