

## 药学综合知识与技能

## 一、最佳选择题

1.在患者入院、转科和出院时，药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱，核对患者目前的整体用药情况，避免漏用药物、重复用药、剂量错误和不良药物相互作用等，以保证患者用药安全的药学服务过程，属于

- A.药物重整
- B.处方审核
- C.药物利用评价
- D.药学干预
- E.处方点评

2.患者，男，65岁，临床诊断：2型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

处方：美托洛尔缓释片 47.5 mg qd po

单硝酸异山梨酯缓释片 10mg qd po

瑞格列奈片 1mg tid po

阿卡波糖片 50 mg tid po

甲钴胺片 0.5 mg tid po

药师对该处方的审核和分析正确的是

- A.选用美托洛尔缓释片不合理
- B.单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- C.瑞格列奈片用量不合理
- D.选用阿卡波糖片不合理°
- E.甲钴胺片用量不合理

## 二、配伍选择题。

[41~43]

- A.亚甲蓝
- B.氟马西尼
- C.纳洛酮
- D.二巯丙醇
- E.乙酰胺

41.患者，女，46岁，因琐事吵架后，服用艾司唑仑 100 片，可选用的解救药物是

42.患儿，女，5岁，误服灭鼠药（氟乙酰胺），可选用的解救药物是

43.患者，男，64岁，为缓解剧烈癌痛，同时使用 5 片芬太尼透皮贴剂后，出现呼吸抑制，可选用的解救药物是

[44~45]

- A.对乙酰氨基酚片
- B.芬太尼透皮贴片
- C.羟考酮缓释片
- D.卡马西平片
- E.塞来昔布胶囊

44 患者近期出现双手关节肿胀、疼痛，伴晨僵诊断为类风湿性关节炎，应选的药物是

45.由带状疱疹所致的严重后遗神经痛，应选的药物是

[46~47]

A.ALT

B.APTT

C.INR

D.RBC

E.WBC

46.服用华法林期间应进行监测的指标是

47 使用肝素静脉滴注明间需监测的指标是

[81~82]

A.普萘洛尔

B.非洛地平

C.卡托普利

D.多沙唑嗪

E.氢氯噻嗪

81.患者，男，69岁，因高血压长期服用抗高血压药，近日患者出现足踝部水肿，可引起此不良反应的药物是

82.患者，男，65岁，诊断为高血压2级，同时有哮喘病史，不宜选用的药物是

[83~85]

A.多潘立酮片

B.酵母片

C.乳酸生片

D.甲氧氯普胺片

E 铝碳酸镁咀嚼片

83.患者，女，48岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是

84.患者，女，60岁，因胆汁反流、腹痛来药店，购药，药师应推荐的药品是

85 患者，男，53岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

[86~87]

A.缬沙坦

B.呋塞米

C.普萘洛尔

D.硝苯地平

E.卡托普利

86.举重运动员使用后，可短时间内急速降低体重因此需按兴奋剂管理的药物是

87.射击运动员使用后，可减慢心率，减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是

[88~90]

A.山莨菪碱

- B.布洛芬
- C.麦角胺咖啡因
- D.卡马西平
- E.吗啡

88.患者，女，47岁，出现一侧颜面部骤然发作性闪痛，诊断为三叉神经痛，应选用的药物是

89.患者，女，25岁，痛经应选用的药物是

90.患者，男，38岁，因腹部受寒胃脘疼痛，应选用的药物是

