

1. 根据中医理论，“病”“证”“症”的概念不同，下列表述中属于“病”的是

- A. 厌食
- B. 暖气
- C. 腕痞
- D. 腹胀
- E. 便溏

答案：A

解析：症：疾病的外在表现，症状

证：机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括

病：疾病的简称

2. 治疗阳虚证，使用补阳药时常佐用少量补阴药的治法，称为

- A. 阴阳互制
- B. 阳病治阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳中求阴
- E. 阴中求阳

答案：E

解析：无

3. 根据阴阳相互关系，寒极生热，热极生寒属于阴阳的

- A. 相互交感
- B. 对立制约
- C. 互根互用
- D. 消长平衡
- E. 互相转化

答案：E

解析：无

4. 某女，35岁，因家庭纠纷，情志不畅导致肝气郁结，影响脾胃运化功能，其疾病传变是（ ）

- A. 相克
- B. 子病及母
- C. 相乘
- D. 母病及子
- E. 相侮

答案：C

解析：本题脏腑变化是从肝到脾，所以是相乘。

5. 具有推动血液运行，主宰精神活动等生理功能的是

- A. 肝主藏血
- B. 肝主疏泄
- C. 脾主统血
- D. 心主血脉

E. 肺朝百脉

答案：D

解析：无

6. 脏腑经络功能减退，血液生成不及，运行迟缓，水液在体内潴留等病变，与气机功能失常密切相关的是（ ）

- A. 温煦作用
- B. 推动作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

答案：B

解析：气的推动不足，会出现血液、津液的生成不足，运行滞缓，而发生血虚、血行不利或水液在体内潴留等病变。

7. 称为“十二经脉之海”的静脉是（ ）。

- A. 带脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 冲脉
- E. 阴维脉

答案：D

解析：冲脉：血海 十二经脉之海，与生殖月经有关

8. 某女，55岁。全身关节肌肉疼痛较剧烈，阴雨天加重，属于寒邪所致。其病因性质是

- A. 凝结阻滞
- B. 黏腻停滞
- C. 沉重秽浊
- D. 阻遏气机
- E. 收缩牵引

答案：A

解析：寒：1 凝滞、主痛 2 收引。阴邪、易伤阳气

9. 根据七情内伤致病理论，思虑太过可导致

- A. 气上
- B. 气结
- C. 气消
- D. 气下
- E. 气乱

答案：B

解析：怒则气上，喜则气缓，思则气结，悲则气消，恐则气下，惊则气乱

10. 体质偏阴者，受邪发病后，多表现为

- A. 寒证、虚证

- B. 热证、虚证
- C. 里证、虚证
- D. 里证、实证
- E. 里证、寒证

答案：A

解析：偏阴体质：身体偏寒、喜静少动、体形适中或偏胖。易受寒湿病。虚证、寒证。水肿、痰饮、瘀血。

11. 某女，20岁。平素情志抑郁，因失恋而致神志异常，诊断为癲病，临床表现可见

- A. 意识不清，突然转佳
- B. 心烦不宁，呼号骂闹
- C. 表情淡漠，哭笑无常
- D. 意识模糊，目光呆滞
- E. 昏不知人，四肢抽动

答案：C

解析：神乱：1、癲：表情淡漠、少言寡语、闷闷不乐、哭笑无常。
2、狂：登高而歌、弃衣而走、呼号怒骂，打人毁物。
3、痫：突然跌倒、口吐白沫、昏不知人、四肢抽动。

12. 阴精亏损，不能荣润，常见的舌形是（ ）

- A. 胖嫩舌
- B. 齿痕舌
- C. 瘦薄舌
- D. 裂纹舌
- E. 芒刺舌

答案：D

解析：裂纹舌：阴液亏损。1、红绛有裂纹：热盛伤津、阴精亏损。2、舌淡有裂纹：血虚不润。

13. 根据中医望诊理论，热邪亢盛可见（ ）。

- A. 齿痕舌
- B. 胖大舌
- C. 芒刺舌
- D. 痿软舌
- E. 瘦薄舌

答案：C

解析：芒刺舌：热邪亢盛。位置不同热邪亢盛脏腑不同。

14. 虚喘多见

- A. 呼吸不畅，胸闷气短
- B. 呼吸有力，声高气粗
- C. 呼吸困难，短促急迫
- D. 呼吸困难，喉中有声
- E. 呼多吸少，气不得续

答案：E

解析：无

15. 某男，30岁，居处潮湿，长夏发病，诊断为湿温潮热，其发病特征是

- A. 午后发热，五心烦热
- B. 午后热甚，身热不扬
- C. 日晡热甚，腹痛便结
- D. 长期低热，劳倦则甚
- E. 发热烦渴，汗多脉洪

答案：B

解析：湿温潮热：午后热甚、身热不扬。

16. 自汗的病机是

- A. 气虚卫阳不固所致
- B. 营卫不和
- C. 阳热内盛迫津外泄
- D. 阴虚而致
- E. 中焦湿热

答案：A

解析：自汗：出汗不止运动后更重、是气虚

17. 八纲辨证中，寒热症候主要辨析的是

- A. 疾病部位
- B. 疾病原因
- C. 疾病性质
- D. 病势趋向
- E. 疾病传变

答案：C

解析：阴阳：总纲。表里：病变位置和趋向。寒热：疾病性质。虚实：邪正盛衰

18. 气虚证的临床表现通常可见

- A. 神疲乏力
- B. 脱肛
- C. 暖气
- D. 恶寒喜暖
- E. 头重如裹

答案：A

解析：气虚：少气懒言、疲倦乏力

19. 患者便血月余，血色紫暗，夹血块。舌紫暗，脉细涩。诊断为

- A. 血瘀证
- B. 气虚证
- C. 气逆证
- D. 血寒证

E. 血虚证

答案：A

解析：血瘀：有血块、刺痛、夜间加重

20. 患儿，8岁。倦怠乏力，食少纳呆，气短懒言，面色苍白，皮下出血色淡，舌淡，脉软弱细微。中医辨证是

- A. 气血两虚证
- B. 气随血脱证
- C. 气滞血瘀证
- D. 气虚血瘀证
- E. 气不摄血证

答案：E

解析：气不摄血：出血同时见气短、乏力面白。

21. 心阴虚证可见

- A. 头晕胀痛
- B. 畏寒肢冷
- C. 体倦乏力
- D. 面色无华
- E. 五心烦热

答案：E

解析：心阴虚：心悸心烦失眠健忘，低热盗汗五心烦热

22. 某女，30岁，难产。分娩后头晕目眩，视物模糊，肌肉颤动，手足拘急，面色无华，口唇色淡，中医辨证为

- A. 肝阳化风
- B. 血虚生风
- C. 热极生风
- D. 阴虚风动
- E. 血燥生风

答案：B

解析：血虚生风：面色萎黄、肢体麻木。

23. 脾阳虚证，常见的临床表现是

- A. 纳食减少，食后作胀，肢体浮肿，大便溏泻
- B. 纳食减少，脘腹胀满，头重身倦，便溏稀薄
- C. 纳食减少，食后作胀，少腹下坠，内脏下垂
- D. 纳食减少，腹中冷痛，口泛清水，四肢不温
- E. 纳食减少，脘腹胀满，黄疸鲜明，发热口苦

答案：D

解析：脾阳虚：腹中冷痛、腹满时减

24. 患者干咳，少痰难咯，甚或痰中带血，口干咽燥，颧红潮热。舌红少苔，脉细数。诊断为

- A. 燥邪犯肺证
- B. 肺肾阴虚证
- C. 肺阴虚证
- D. 肝火犯肺证
- E. 肺热炽盛证

答案：C

解析：肺阴虚：咳嗽较重、干咳无痰、阴虚火旺时还会有，咳痰带血

25. 患者咳嗽声嘶哑，痰少带血，潮热盗汗，腰膝酸软。舌红少苔，脉细数。诊断为

- A. 肺肾阴虚证
- B. 脾肾两虚证
- C. 心肾不交证
- D. 心肺两虚证
- E. 肺脾两虚证

答案：A

解析：无

26. 表热证用辛凉解表方药，里热证用清热泻火方药治疗。体现的治法是

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 用热远热
- D. 寒因寒用
- E. 热因热用

答案：B

解析：无

27. 治疗有瘀血的崩漏病人，应

- A. 扶正
- B. 祛邪
- C. 扶正与祛邪兼用
- D. 先祛邪后扶正
- E. 先扶正后祛邪

答案：D

解析：先祛邪后扶正：邪盛正虚，但正气尚能耐攻，或同时兼顾扶正反会助邪。如瘀血所致的崩漏。

28. 患者突然恶寒，甚则寒战，高热不退，周身酸痛，无汗，咳嗽、口干、咽喉疼痛，伴明显全身症状，呈现流行性发作。宜选用的治法是

- A. 益气解表
- B. 清热泻火
- C. 疏肝解郁
- D. 清热宣肺解表
- E. 清瘟解毒

答案：E

解析：患者表现为时行感冒，治法为清瘟解毒。

29. 患者咳嗽气粗，痰多黄稠，烦热口干。舌红，苔黄腻，脉滑数。宜选用的方剂是

- A. 清金化痰汤
- B. 白虎汤
- C. 银翘散
- D. 桑菊饮
- E. 定喘汤

答案：A

解析：患者表现为痰热壅肺所致的咳嗽，选用的方剂为清金化痰汤。

30. 患者胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩或结、代。宜选用的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生脉散
- D. 桑菊饮
- E. 定喘汤

答案：A

解析：本题患者为胸痹，气虚血瘀证，使用方剂为补阳还五汤。

31. 患者胃脘灼痛，痛势急迫，烦躁易怒，泛酸嘈杂，口干口苦。舌红苔黄，脉弦或弦数。宜选用的中成药是

- A. 良附丸
- B. 保和丸
- C. 加味左金丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 黄芪健中汤

答案：C

解析：本题患者为胃痛，肝胃郁热证，使用的中成药为加味左金丸。

32. 患者大便秘结，欲便不得，暖气频作，胸胁痞满，甚则腹中胀痛，纳食减少。舌苔薄腻，脉弦。辨证为

- A. 热结肠胃证
- B. 气滞郁结证
- C. 津亏肠燥证
- D. 阳虚寒凝证
- E. 脾胃虚寒证

答案：B

解析：本题患者为便秘，气滞郁结证。

33. 中风后语言不利的属于风痰阻络的方剂选用

- A. 解语丹加减
- B. 镇肝熄风汤

- C. 地黄饮子
- D. 小蓟饮子
- E. 天麻钩藤饮合小青龙汤

答案：A

解析：中风所致语言不利，风痰阻络证应选用解语丹。

34. 患者，男，经常感到口渴，食量大，容易饥饿，小便频数而多，尿黄，最近身体消瘦明显，舌红苔薄黄，脉滑数。首选方是

- A. 金匱肾气丸
- B. 六味地黄丸
- C. 消渴方
- D. 玉女煎
- E. 百合固金汤

答案：D

解析：本题患者为消渴，阴虚燥热证，选用的方剂为玉女煎。

35. 治疗阴虚所致的虚劳，宜选用的方剂是

- A. 桂附地黄丸
- B. 四物汤
- C. 理中丸
- D. 四君子汤
- E. 沙参麦冬汤

答案：E

解析：无

36. 痤疮胃肠湿热证宜选用的内服的中成药是

- A. 防风通圣丸
- B. 牛黄醒消丸
- C. 连翘败毒丸
- D. 黄连上清丸
- E. 清肺抑火丸

答案：A

解析：无

37. 患者便血色鲜红，量较多，肛内肿物 外脱，可自行回缩，肛门灼热。舌红，苔黄腻，脉弦数，证属

- A. 湿热下注所致内痔
- B. 湿热下注所致外痔
- C. 气滞血瘀所致内痔
- D. 气滞血瘀所致外痔
- E. 脾虚气陷所致内痔

答案：A

解析：无

38. 患者，女，20岁，未婚。近3年来每次月经提前7~10天，量多色淡质清，腰酸腿软，小便清长，夜尿频，舌淡暗，苔薄白，脉沉细。其诊断是

- A. 月经过多脾虚证
- B. 月经过多血热证
- C. 月经先期肾气虚证
- D. 月经先期肝经郁火证
- E. 月经先后不定期肾虚证

答案：C

解析：无

39. 圣愈汤治疗崩漏的适应证是

- A. 气血两虚证
- B. 脾不统血证
- C. 瘀血阻络证
- D. 肝肾不足证
- E. 心脾两虚证

答案：A

解析：无

40. 乳食内积导致的食积，治宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 保和丸
- C. 枳术丸
- D. 消积理脾汤
- E. 龙胆泻肝汤

答案：B

解析：本题重点为食积，故选择保和丸，易错选项A。

41. 某男，6岁。厌食，面色萎黄，神疲多汗，大便稀薄，夹有未消化食物，形体偏瘦，肢倦乏力。治宜选用的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 归脾丸
- C. 四物汤
- D. 清宁丸
- E. 异功散

答案：E

解析：本题患者为厌食，脾胃气虚证，选用的方剂为异功散

42. 由宋代官府颁行的我国第一部成药典是

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草纲目》
- C. 《太平圣惠方》
- D. 《千金翼方》
- E. 《太平惠民和剂局方》

答案：E

解析：太平惠民和剂局方：是我国第一部成药典。

43. 处方对药品品质提出要求的药名是

- A. 怀山药
- B. 田三七
- C. 东阿胶
- D. 江枳壳
- E. 子黄芩

答案：E

解析：无

44. 下列中药处方中不属于正名的是

- A. 重楼
- B. 木蝴蝶
- C. 西红花
- D. 白果
- E. 坤草

答案：E

解析：益母草的别名为坤草。

45. 下列中药应付烫制品的是

- A. 穿山甲
- B. 僵蚕
- C. 厚朴
- D. 地榆
- E. 延胡索

答案：A

解析：写药名付烫制品的有龟甲、鳖甲、穿山甲

46. 与半夏相反的中药是

- A. 瓜蒌
- B. 白芍
- C. 丹参
- D. 甘草
- E. 乌头

答案：E

解析：“半蒌贝薤及攻乌”，半夏反乌头

47. 属“十九畏”的药组是

- A. 甘草与瓜蒌
- B. 郁金与丁香
- C. 乌头与半夏
- D. 海藻与京大戟

E. 人参与细辛

答案：B

解析：“丁香莫与郁金见”郁金与丁香为十九畏

48. 驱虫、泻下药宜

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 空腹服
- D. 睡前服
- E. 发作前 1~2 h 服

答案：C

解析：驱虫、泻下药宜空腹服用

49. 服用更衣丸宜用的“药引”是

- A. 姜汤
- B. 米汤
- C. 盐水
- D. 黄酒
- E. 芦根煎汤

答案：B

解析：四神丸和更衣丸，用的药引子为米汤

50. 妊娠禁用的中药是

- A. 莪术
- B. 半枝莲
- C. 半边莲
- D. 白茅根
- E. 白附子

答案：A

解析：妊娠禁用中药多为剧毒或性能峻猛的中药。莪术的药性比较峻猛，故选择莪术

51. 脾虚便溏者忌用

- A. 开窍药
- B. 苦寒药
- C. 息风药
- D. 涩肠药
- E. 淡渗利湿药

答案：B

解析：无

52. 由于外观性状相似但功效不同，不宜排列在一起的药物是

- A. 板蓝根和大青叶
- B. 当归和川芎
- C. 篇蓄和瞿麦

- D. 当归和独活
- E. 牡丹皮和赤芍

答案：D

解析：无

53. 宜后下的饮片是

- A. 降香
- B. 鹿角霜
- C. 海金沙
- D. 西红花
- E. 紫河车

答案：A

解析：后下

- 1 芳香：降香沉香、鱼腥草薄荷、砂仁豆蔻煎后 5-10 分。
- 2 易破坏：钩藤生大黄、苦杏仁、徐长卿、番泻叶 10-15 分。

54. 中药汤剂煎煮时宜包煎的是

- A. 质地坚硬的饮片
- B. 含挥发性成分的饮片
- C. 久煎后有效成分宜破坏的饮片
- D. 富含绒毛的饮片
- E. 矿物类饮片

答案：D

解析：包煎

- 1 黏性：车前子、葶苈子。
- 2 绒毛：枇杷叶、旋覆花。
- 3 花粉：六一散、蒲黄、蛤粉、海金沙。

55. 沉香粉，雷丸宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 冲服
- D. 另煎
- E. 煎汤代水

答案：C

解析：冲服

雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇

56. 马钱子的用量应控制在

- A. 0.2~0.4 g
- B. 0.3~0.6 g
- C. 0.5~0.7 g
- D. 0.6~0.8 g
- E. 0.8~1.0 g

答案：B

解析：无

57. “有毒”中药是

- A. 吴茱萸、蟾酥
- B. 车前子、地肤子
- C. 京大戟、蟾酥
- D. 马钱子、急性子
- E. 枇杷叶、侧柏叶

答案：C

解析：无

58. 下列因含脂肪油成分引起中药饮片泛油的是

- A. 薄荷
- B. 川芎
- C. 肉桂
- D. 荆芥
- E. 柏子仁

答案：E

解析：泛油：含糖：牛膝、天冬、麦冬、熟地、黄精。

含油脂：柏子仁、桃仁、杏仁。

含挥发油：当归、苍术

59. 一般中药炮制品的绝对含水量应控制在

- A. 5%~10%
- B. 5%~13%
- C. 7%~10%
- D. 7%~13%
- E. 7%~15%

答案：D

解析：饮片炮制品后含水量 7%—13%，贮存环境相对湿度控制在 35%—75%。

60. 极易霉变的环境温度和湿度是

- A. 温度 20~35 ℃ 湿度 75%以上
- B. 温度 20~35 ℃ 湿度 75%以下
- C. 温度 10~20 ℃ 湿度 75%以上
- D. 温度 10~20 ℃ 湿度 75%以下
- E. 温度 10~20 ℃ 湿度 60%以上

答案：A

解析：霉变：一般室温在 20~35℃，相对湿度在 75%以上

61. 避光不超过 20 ℃的环境是指

- A. 常温
- B. 冷处

- C. 暗处
- D. 凉暗处
- E. 阴凉处

答案：D

解析：凉暗：避光不超 20℃

62. 宜与蛤蚧同贮的是

- A. 牡丹皮
- B. 细辛
- C. 红花
- D. 灯心草
- E. 吴茱萸

答案：E

解析：蛤蚧和花椒、吴茱萸、萆薢可以起对抗养护

63. 合理用药基本原则中首要考虑的是

- A. 有效
- B. 安全
- C. 经济
- D. 使用方便
- E. 便于贮存

答案：B

解析：合理用药的基本原则：安全、有效、简便、经济。首要考虑安全。

64. 下列中成药联合用药合理的是

- A. 天麻丸与川贝枇杷胶囊
- B. 六味地黄丸与脑立清
- C. 珍菊降压片与大活络丸
- D. 苏合香丸与胆宁片
- E. 大活络丸与通宣理肺丸

答案：B

解析：无

65. 与归脾丸联用，治疗心悸失眠、眩晕健忘的中成药是

- A. 天麻丸
- B. 四神丸
- C. 六味地黄丸
- D. 人参养荣丸
- E. 右归丸

答案：D

解析：无

66. 下列中成药联合用药合理的是

- A. 天麻丸与川贝枇杷胶囊

- B. 二陈丸与平胃散
- C. 珍菊降压片与复方枇杷糖浆
- D. 苏合香丸与胆宁片
- E. 大活络丸与通宣理肺丸

答案：B

解析：无

67. 跌打损伤常用的药引是

- A. 大枣
- B. 绿豆汤
- C. 蜂蜜
- D. 白酒
- E. 淡盐水

答案：D

解析：无

68. 利胆中成药胆乐胶囊避免与下列哪种药物合用

- A. 利胆排石片
- B. 胆宁片
- C. 六应丸
- D. 大活络丸
- E. 天麻丸

答案：C

解析：胆乐胶囊中含有郁金，不能和含有丁香的六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正丸、紫雪丸同用。

69. 下列配伍应用的药组中，属于不合理联用的是

- A. 附子理中丸与四神丸
- B. 归脾丸与人参养荣丸
- C. 朱砂安神丸与天王补心丸
- D. 六味地黄丸与补中益气丸
- E. 二陈丸与平胃散

答案：C

解析：朱砂安神丸与天王补心丹合用，两者均含朱砂

70. 因功能相反而不宜合用的是

- A. 益母草膏与妇血康颗粒
- B. 妇科千金片与当归四物汤
- C. 补中益气丸与金匱肾气丸
- D. 附子理中丸与牛黄解毒片
- E. 祛痰止咳颗粒与通宣理肺丸

答案：D

解析：附子理中丸和牛黄解毒片是证候不同，禁止联用

71. 下列药物联用可以导致药源性肠炎的有

- A. 磁朱丸与消瘦五海丸
- B. 安宫牛黄丸与金匱肾气丸
- C. 更衣丸与速效救心丸
- D. 朱砂安神丸与天王补心丹
- E. 金匱肾气丸与牛黄解毒片

答案：A

解析：无

72. 丹参注射液与间羟胺(阿拉明)、多巴胺等升压药同用属于

- A. 扩大适应范围
- B. 降低毒副作用
- C. 减少剂量
- D. 协同增效
- E. 减少禁忌

答案：D

解析：无

73. 与化疗药联用可降低患者因化疗导致的白细胞降低等不良反应的中药是

- A. 石菖蒲
- B. 牵牛子
- C. 人参
- D. 柴胡
- E. 白芍

答案：C

解析：化疗后常出现燥热伤津的阴虚内热或气阴两虚减轻。故应使用滋阴润燥清热或益气养阴中药。

74. 在珍菊降压片中，盐酸可乐定的用量比单用剂量减少

- A. 50%
- B. 60%
- C. 65%
- D. 70%
- E. 80%

答案：B

解析：珍菊降压片与盐酸可乐定，减少用量 60%。

75. 与碱性中药联用可防止西药被胃酸破坏，增强肠道吸收，从而增强抗菌作用的西药是

- A. 红霉素
- B. 链霉素
- C. 庆大霉素
- D. 卡那霉素
- E. 阿米卡星

答案：A

解析：无

76. 能使氨基糖苷类抗生素排泄减少，吸收增加，易引起暂时性或永久性耳聋的中药是

- A. 芒硝
- B. 雄黄
- C. 硼砂
- D. 石膏
- E. 硫黄

答案：C

解析：无

77. 地榆与乳酶生联用，可

- A. 影响药物吸收
- B. 影响药物分布
- C. 影响药物代谢
- D. 增加药物排泄
- E. 减少药物排泄

答案：C

解析：无

78. 联用增加药物排泄的药组是

- A. 麻仁丸与红霉素
- B. 冰硼散与青霉素
- C. 银杏叶制剂与地高辛
- D. 大活络丸与异烟肼
- E. 苓桂术甘汤与普萘洛尔

答案：B

解析：无

79. 大环内酯类药与山茱萸联用能

- A. 产生金属螯合物
- B. 减少排泄
- C. 增加排泄，降低疗效
- D. 形成络合物
- E. 增加肝毒性，甚至引起听觉障碍

答案：B

解析：无

80. 某男，因患慢性心衰，长期服用强心苷类药物，现咽喉红肿疼痛，音哑失声。下列中成药中，不宜与强心苷类药物同用的中成药是

- A. 六神丸
- B. 清音丸
- C. 金果饮
- D. 黄氏响声丸

E. 牛黄解毒片

答案：A

解析：无

81. 中西药联用会降低疗效的药组

- A. 参茸片和格列本脲
- B. 灵芝片与苯巴比妥
- C. 四逆汤与地高辛
- D. 小青龙合剂与氨茶碱
- E. 丹参注射液与多巴胺

答案：A

解析：含甘草、鹿茸的中成药不与胰岛素、甲苯磺丁脲、格列本脲同用。

82. 因含有马来酸氯苯那敏，司机和登高作业者不宜服用的中成药是

- A. 强力感冒片
- B. 金羚感冒片
- C. 抗感灵片
- D. 感冒清热颗粒
- E. 舒肺糖浆

答案：B

解析：无

83. 不宜与银杏叶同时服用的是

- A. 阿司匹林
- B. 阿卡波糖
- C. 复合维生素 B
- D. 地高辛
- E. 法莫替丁

答案：E

解析：法莫西丁与银杏叶同用：螯合物影响疗效。

84. 老年人服用地高辛时不宜同时服用的中成药是

- A. 麝香保心丸
- B. 六味地黄丸
- C. 人参鹿茸丸
- D. 银杏叶制剂
- E. 柴胡舒肝丸

答案：A

解析：麝香保心丸与地高辛同用：诱发强心苷中毒。

85. 阳虚的老年人宜选用的补益药为

- A. 生脉饮
- B. 六味地黄丸
- C. 人参归脾丸

- D. 龟龄集
- E. 天王补心丹

答案：D

解析：无

86. 临床使用不当可导致急性肾功能衰竭的中药是

- A. 南沙参
- B. 牡丹皮
- C. 马兜铃
- D. 瓜蒌皮
- E. 北沙参

答案：C

解析：影响肾功能的中药，含生物碱引起肾衰：蓖麻子、麻黄、益母草、草乌、雷公藤、北豆根、马兜铃、天仙藤、寻骨风。

87. 具有肝脏毒性的中药是

- A. 使君子
- B. 黄药子
- C. 女贞子
- D. 车前子
- E. 牛蒡子

答案：B

解析：影响肝功能的中药

苷类：三七、商陆、黄药子

毒蛋白：苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆

多肽类、萜与内脂类：川楝子、艾叶、黄药子

鞣质类：五倍子、石榴皮、诃子

动物类：蜈蚣、蟾蜍、斑蝥、鱼胆、猪胆。

矿物类：砷类、汞类、铅类(铅丹、密陀僧)

88. 过量服用会引起血尿的中药是

- A. 麻黄
- B. 肉桂
- C. 黄芪
- D. 石斛
- E. 人参

答案：B

解析：肉桂过量会发生血尿。

89. 小金丸含有的有毒中药材是

- A. 蟾酥
- B. 乌头类
- C. 朱砂

- D. 红粉
- E. 马钱子

答案：B

解析：无

90. 马钱子中毒，可注射的解毒药物是

- A. 阿托品
- B. 苯巴比妥钠
- C. 二巯基丙醇
- D. 硫代硫酸钠
- E. 亚硝酸钠

答案：B

解析：马钱子中毒解救，吸氧。洗胃。苯巴比妥 0.2-0.3mg 注射。肉桂或甘草汤

91. 蟾酥中毒的主要临床表现为

- A、口舌、四肢及全身麻木、头痛、头晕、精神恍惚、牙关紧闭
- B、头晕、头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难、伸肌与屈肌同时收缩
- C、喉咙干痛、烧灼感、口中金属味、流涎、腹痛腹泻，出现各种出血症状、黄疸
- D、胸闷、心悸、心律不齐、四肢厥冷、血压下降、心电图显示房室传导阻滞
- E、严重脱水、低蛋白血症、水肿、精神错乱、幻觉、癫痫样发作

答案：D

解析：无

92. 内含雄黄的中成药是

- A. 木瓜丸
- B. 舒筋丸
- C. 牛黄醒消丸
- D. 苏合香丸
- E. 独活寄生丸

答案：C

解析：无

93. 朱砂中毒，可使用的解毒药物是

- A. 阿托品
- B. 苯巴比妥钠
- C. 利多卡因
- D. 硫代硫酸钠
- E. 亚硝酸钠

答案：D

解析：朱砂中毒解救，催吐。二巯丙醇磺酸钠。透析。甘草绿豆或土茯苓煎汤

94. 误服过量可产生氢氰酸中毒，使延髓等生命中枢先抑制后麻痹的中药是

- A. 细辛
- B. 苦杏仁

- C. 胆矾
- D. 雷公藤
- E. 香加皮

答案：B

解析：过量苦杏仁可产生氢氰酸中毒，使延髓等生命中枢先抑制后麻痹，临床表现为眩晕、心悸、恶心、呕吐等

95. 香加皮的主要不良反应是（ ）

- A. 导致精子产生和成熟发生障碍，抑制女性患者巢功能
- B. 恶心呕吐，腹痛腹泻，重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血
- C. 直接作用于中枢神经系统，甚或因呼吸中枢完全麻痹而致死
- D. 血小板、白细胞、血红蛋白减少，并可发生急性粒细胞减少
- E. 心律失常，如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

答案：E

解析：香加皮：

不良反应表现（1）消化系统：主要为恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状。

（2）心血管系统：主要为心律失常。如心率减慢、早搏，房室传导阻滞等。

96. 雷公藤中毒，严重者主要表现为

- A. 出现各种出血症状，严重脱水，低蛋白血症
- B. 呼吸麻痹，昏迷惊厥，瞳孔散大，对光反射消失
- C. 急性肾功能衰竭，粒细胞减少，再生障碍性贫血
- D. 呼吸浅表不规则，面色苍白发绀，瞳孔极度缩小呈针尖样
- E. 四肢麻木，谵妄，痉挛，脑水肿，意识障碍，精神错乱

答案：C

解析：雷公藤：消化、急性粒细胞减少、再障、男性精子女性卵巢、心血管

97. 蜈蚣的主要不良反应是

- A. 溶血性贫血，酱油尿、黑便
- B. 乏力、纳差、尿黄、头晕、厌油腻
- C. 心律失常
- D. 肾毒性
- E. 神经系统毒性

答案：A

解析：蜈蚣：溶血性贫血，酱油尿、黑便

98. 因服用过量而发生药物不良反应，可致呼吸麻痹而死亡的中药是

- A. 细辛
- B. 使君子
- C. 胆矾
- D. 雷公藤
- E. 香加皮

答案：A

解析：细辛中的挥发油直接作用于中枢神经系统，最终可因呼吸中枢完全麻痹而致死。

99. 苍耳子的主要不良反应是

- A. 导致精子产生和成熟发生障碍，抑制女性患者巢功能
- B. 恶心呕吐，腹痛腹泻，重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血
- C. 直接作用于中枢神经系统，甚或因呼吸中枢完全麻痹而致死
- D. 血小板、白细胞、血红蛋白减少，并可发生急性粒细胞减少
- E. 心律失常，如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

答案：B

解析：苍耳子的不良反应有血小板减少性紫癜、神经性水肿、声哑、喉头水肿、喉梗塞等

100. 罂粟壳中毒的典型症状是

- A. 精神亢奋
- B. 呼吸急促
- C. 血压升高
- D. 瞳孔急速缩小
- E. 心跳加速

答案：D

解析：罂粟壳其临床表现为昏睡或昏迷、抽搐、呼吸浅表而不规则、恶心、呕吐、腹泻、面色苍白、发绀、瞳孔极度缩小呈针尖样、血压下降等。